VADEMÉCUM

INDEX OF VETERINARY PRODUCTS

over®

MEDICINA VETERINARIA

VETERINARY MEDICINE

ÍNDICE INDEX

Acción terapeútica. Therapeutic action

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Company Profile....07

LÍNEA GRANDES ANIMALES
Products Line for Large Animals

01- ANTIBIÓTICOS
Antibiotics

Inyectables / Injectable Products
Amoxicilina 200 OVER....22
Cefalexina 200 OVER....22
Ceftiofur L.P.U. OVER....23
Ceftiofur OVER....23
Florfenicol 300....24
Gemicin 100....24
Overbiotic....25
Overbiotic L.A....25
Overbiotic L.A PLUS....26
Overcef S.I....26
Overfloxacin....27
Overkin....27
Penicilina Estreptomicina 5.000.000 U.I....28
Tilmicosina OVER 30%....28
Tilosina 20 OVER....29
Orales / Oral Products
Amoxicilina POLVO SOLUBLE OVER....29
Florfenicol PREMIX 2% OVER....30
Florfenicol PREMIX 20% OVER....30
Florfenicol SOLUCIÓN ORAL 10% OVER....31
Neosulf....31
Neosulf C....32
Neover....32
Overbiotic POLVO SOLUBLE....33
Overfloxacin ORAL....33
Oversulfa....34
Tilmicosina OVER CONCENTRADO ORAL....34
Tilmicosina PREMIX 20% OVER....35
Locales / Local Products
Gemicin SPRAY....35
Overbiotic 100....36
Intrauterinos / Intrauterine Products
Metrisan....36
Óvulos INTRAUTERINOS OVER....37
Intramamarios / Intramammaries
Cefakan....37
Di Eritromast MASTITIS AGUDA....38
Lactamox....38
Lactamox SECADO....39
Lactomicin INTRAMAMARIO....39
Overclox M.A....40
Overmast SECADO....40
Overseal....41
Antidiarreicos / Antidiarrheals
Overbiotic ANTIDIARREICO INYECTABLE....41
Oversulf ADI....42
Con Antiinflamatorios / Including Anti-inflammatories
Ceftiover MAXIUM....42
Overbiotic DUO....43
Overpen COMPUESTO L.P.U....43
Overpen FORTE....44
Overtil FORTE....44
Trifect FORTE....45

02- ANTIINFLAMATORIOS
Anti-inflammatories

Inyectables / Injectable Products
Dexametasona L.A. OVER....48
Dexametasona OVER....48
Enzivet....49
Flumeg....49
Overxicam....50
Synedem....50
Orales / Oral Products
Overxicam GEL EQUINOS....51
Locales / Local Products
GEL PARA EQUINOS OVER Masagel....51

03- ANTIPARASITARIOS ENDECTOCIDAS
Endectocide Antiparasitics

Inyectables / Injectable Products
Dovertec....54
Overmax L.A. PREMIUM....54
Overmax PREMIUM....55
Overmectina DUPLEX....55
Overmectina F....56
Overmectina L.A. ZINC....56
Overmectina L.A. ZINC 1%....57
Overmectina MAGNUM 4%....57
Overmectina TRIPLEX....58
Vermectín....58
Vermectín L.A. PREMIUM....59

Orales / Oral products
Overmectina TOTAL EQUINOS....59
Overmectina TRIPLE ORAL....60
Trimox PLUS....60
Vermectín B12 EQUINOS....61
Vermectín PREMIX PORCINOS....61
Pour On / Pour on products
Eprinover POUR ON....62
Vermectín POUR ON....62

04- ANTIPARASITARIOS EXTERNOS
External Antiparasitics

Caravanas / Ear Tags
Caravanas INSECTICIDAS SYNECT DC....64
Caravanas OVER DIAZINÓN 40%....64
Aspersión. Inmersión / Spraying. Immersion
Garrathion MAX OVER....65
Mos-k-tión A.I....65
Overtraz....66
Synect ASPERSIÓN....66
Locales / Local Products
Synect PLATA LÍQUIDO....67
Pour On / Pour On Products
Mos-k-tión F....67
Mos-k-tión P.F....68
Overline LARGE....68
Overline LARGE DUO....69
Overtak....69
Overtak FULL....70
Super Synect POUR ON....70
Synect POUR ON....71
Synect PREMIUM....71
Polvos / Powder Products
Synect CURABICHERAS POLVO....72
Aerosoles/ Aerosol Products
Synect PLATA AEROSOL....72

05- ANTIPARASITARIOS INTERNOS
Internal antiparasitics

Inyectables / Injectable Products
Overmisol 200....74
Overxinil....74
Ricomax....75
Ricomax N.F....75
Orales / Oral Products
Albendazol OVER (Overzol) 3,8 Co....76
Albendazol OVER (Overzol) 10 Co....76
Eleval OVINOS....77
Overcox 2,5%....77
Overcox 5%....78
Overfen 10%....78
Overfen PREMIX PORCINOS....79
Triclabendazol 5% OVER....79
Triclabendazol 10% OVER....80
Vermox 5 Co ORAL....80
Vermox 10 Co I.R....81

06- HEMOPARASITICIDAS
Hemoparasiticides

Imidover....84
Overseg COMPUESTO L.P.U....84
Overseg PLUS OXI....85

07- AMBIENTALES
Environmental Products

Mosquicidas y Larvicidas / Fly Killers and Larvicides
Overfly CEBO SÓLIDO....88
Overfly CONCENTRADO LARVA 50....88
Overfly LARVA 10....89
Overfly PLUS LARVA 10....89
Synect AMBIENTAL....90
Synect AMBIENTAL ULTRA....90

08- ANTISÉPTICOS, DESINFECTANTES Y CREMAS PROTECTORAS
Antiseptics, Disinfectants and Protective Creams.

Líquidos / Liquid
A.C. 10....92
Curapezuñas CONCENTRADO....92
Iodofos....93
Pervivet....93
Tintura de Iodo FUERTE F.A....94
Ultrafect....94
Cremas protectoras / Protective Creams
Crema de Ordeño OVER....95
Crema Dérmica OVER....95

09- CARMINATIVOS
Carminatives

Polixane....98

Polixane POLVO....98
Rumex....99
Rumex 800 CONCENTRADO....99
Rumex PREMIX....100

10- REPRODUCTIVOS Y HORMONALES
Reproductive Medicines and Hormonals

Inyectables / Injectable Products
Deslogest....102
Estradiol MULTIDOSIS....102
Estradiol OVER....103
Estrosinc....103
Forcecarb....104
Gestar....104
Overgest....105
Oxitocina FUERTE OVER....105
Oxitocina OVER....106
Prostal....106
Dispositivos intravaginales / Intravaginal Devices
Sincrover 700....107
Sincrover 1000....107

11- OTROS
Other Products

Antitóxico POLIVALENTE....110
Atropina 1% OVER....110
Coagulamax DUO....111
Dipirona 50% OVER....111
Hepatoprotector OVER....112
Ioduro de Sodio al 60% OVER....112
Lidocaína OVER 2%....113
Menbutiox....113
Xilazina 10% OVER....114
Xilazina OVER....114

12- VITAMÍNICOS Y MINERALIZANTES
Vitaminics and Mineralizers

Inyectables / Injectable Products
Complejo B FUERTE OVER....116
Cuprexan A.P....116
Hematover PLUS....117
Neocuprexan....117
Over ADE....118
Overcal 50% FUERTE....118
Overferr 200....119
Overfos PLUS....119
Overvital ULTRA....120
Revical....120
Revimag PLUS....121
Revimín....121
Revisel PLUS ADE....122
Orales / Oral Products
Booster Horse OVER....122
Hidramax OVER....123
Vitamínico MINERAL OVER....123

13- PROMOTORES DE CRECIMIENTO
Growth Promoters

Inyectables / Injectable Products
Boldekyl....126
Ganekyl....126
Overweight M....127
Overweight M FORTE....127
Overweight MAX....128
Revimín PLUS....128
Vitabolic PLUS....129
Zeranol OVER....129
Orales / Oral Products
Monensina 20% OVER....130
Ractopamina OVER....130
Ractover 2% OVER....131
Zilpaterol OVER....131
Implantes / Implants
Implantes de ZERANOL OVER....132

14- BIOLÓGICOS
Vaccines

Overvac Anticarbunclosa....134
Overvac Anticlostridial TOTAL + P....134
Overvac Antidiarreica....135
Overvac Clostridial TOTAL....135
Overvac IBR Querato....136
Overvac Maxium TEC....136
Overvac Neumoentérica....137
Overvac Pregnatus....137
Overvac Triple....138

15- LÍNEA PEQUEÑOS ANIMALES
Product Line for Pets

ANESTÉSICOS, ANALÉPTICOS Y TRANQUILIZANTES
Anaesthetics, Analeptics and Tranquilizers
Inyectables / Injectable Products
Ketamina OVER....140
Orales / Oral Products
Sedante OVER....140

ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS
Antibiotics and Antimycotics
Cefalexina P.A. OVER....141
Ceftiover P.A....141
Gotas Óticas OVER....142
Griseofulvina OVER....142

ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS
Anti-inflammatories and Antiallergics
Inyectables / Injectable Products
Overxicam P.A....143
Orales / Oral Products
Ketoprofeno OVER....143
Overxicam SUSPENSIÓN ORAL....144
Prednisolona OVER....144
Triamcinolona OVER....145

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS
External Antiparasitics
Spot On / Spot On Products
Overdog MAX SPOT ON....145
Overline PET....146
Overline PET PLUS CANINOS....146
Overline PET PLUS FELINOS....147
Synect PET SPOT ON....147
Sprays / Spray Products
Overdog PLUS SPRAY....148
Polvos / Powder Products
Synect PET TALCO....148

ANTIPARASITARIOS INTERNOS
Internal Antiparasitics
Overcox P.A....149
Overmix PASTA....149
Overmix TOTAL....150
Oversole P.A....150
Vermectín P.A....151

GASTROENTEROLÓGICOS
Gastroenterological Products
Loperamida OVER....151
Neosulf PET....152
Overclop GOTAS....152

HORMONALES
Hormonals
Inyectables / Injectable Products
Medroxiprogesterona OVER....153
Orales / Oral Products
Megestrol OVER....153

OTROS
Other Products
Protector de Cartílago OVER....154
Shampoo OVER con ALOE VERA....154

OVER,
Medicina Veterinaria

Veterinary Medicine

LA EMPRESA

OVER es una empresa argentina especializada en la síntesis, elaboración, comercialización y distribución de productos de alta calidad para uso en medicina veterinaria.

Misión

La aplicación de tecnología de avanzada y un excelente nivel profesional, impulsan a OVER en la búsqueda constante de innovación en medicina y producción veterinaria.

Su misión es contribuir al bienestar de grandes, medianos y pequeños animales, y optimizar sistemas sanitarios y productivos mediante productos de alta calidad, que posibilitan una mayor y mejor provisión de alimentos para la población mundial.

Ubicación

Sus oficinas centrales y plantas industriales están ubicadas en San Vicente, a 100 km de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia y a 500 km de Buenos Aires, capital de la República Argentina.

THE COMPANY

OVER is an Argentine company specialized in the synthesis, production, commercialization and distribution of high quality products to be used in veterinary medicine.

Mission statement

Deploying a state-of-the-art technology and developing an excellent professional level are the targets driving OVER to carry out a constant search for innovation as regards veterinary medicine and products.

The company's mission is to contribute to the welfare of large, medium-sized and small animals, as well as to optimize the animal health and productive systems through high-quality products able to render the food supply around the world more extended and better.

Location

The company's headquarters and industrial plants are located in San Vicente, a city distant 100 km from the city of Santa Fe (Province of Santa Fe's capital city) and 500 km from Buenos Aires (Argentina's capital city).

OVER,
Más de 3 décadas de innovación, tecnología y calidad

More than 3 decades producing innovation, technology and quality



INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El complejo industrial, con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y capacidad productiva de 15.000.000 de unidades anuales, está compuesto por 6 plantas:

- Planta de Síntesis de Química Fina
- Planta de Antiparasitarios Externos
- Planta de Hormonales
- Planta de Inyectables Generales
- Planta de Orales
- Planta de Betalactámicos

Las instalaciones están equipadas con tecnología de última generación para la producción de medicamentos bajo normas internacionales de calidad BPFPV/GMP, el tratamiento de efluentes, la preservación del medio ambiente y la protección del personal.

FACILITIES AND TECHNOLOGY

The company's industrial complex covers an area of more than 20,000 square meters and features a productive capacity of 15,000,000 units per year. It comprises 6 plants devoted to the following fields:

- Fine chemistry synthesis
- External antiparasitics
- Hormonals
- Injectable products
- Oral products
- Beta-lactam products

The industrial facilities are furnished with modern equipment to manufacture medicines according to international standards governing the quality (GMP), the treatment of effluents, the preservation of the environment and the protection of the staff.

20.000 M²

de trabajo, tecnología y calidad

20.000 M²

for working, and producing technology and quality

Donde se produce calidad

The place where quality is produced



OVER
EN EL MUNDO

La presencia de OVER en más de 50 países evidencia la consolidación y el posicionamiento logrado a nivel internacional. Posee convenios de representación con empresas de:

- Sudamérica
- México
- Centroamérica y el Caribe
- Sudeste Asiático
- África
- Europa
- Medio Oriente

OVER fortalece la relación con sus clientes mediante la comunicación fluida y el asesoramiento permanente, a través de visitas de sus profesionales a representantes nacionales e internacionales.

OVER
IN THE WORLD

The presence of OVER in more than 50 countries clearly shows the positioning and consolidation degree it achieved at the international level. The company has representatives in the following geographical areas:

- South America
- Mexico
- Central America and the Caribbean
- Southeast Asia
- Africa
- Europe
- Middle East

OVER strengthens the business relationship with its customers thanks to a fluent communication and a permanent consultancy service offered through visits of the company's professional staff to its national and international representatives.

50 EXPORTACIONES A MÁS DE 50 PAÍSES DEL MUNDO


Angola
Arabia Saudita
Argelia
Azerbaiyán
Bahréin
Bangladesh
Barbados
Belice
Bolivia
Botswana
Brasil
Camboya
Chile
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas
Guatemala
Guyana
Honduras
India
Irak
Irán
Jamaica
Jordania
Kenia
Kuwait
Líbano
Libia
Marruecos
México
Mozambique
Nicaragua
Omán
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Qatar
República Dominicana
Singapur
Siria
Sri Lanka
Sudáfrica
Taiwán
Trinidad y Tobago
Turquía
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zimbabue

50 EXPORTS TO MORE THAN 50 COUNTRIES OVER THE WORLD

Angola
Algeria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belize
Bolivia
Botswana
Brazil
Cambodia
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
India
Iran
Iraq
Jamaica
Jordan
Kenya
Kuwait
Lebanon
Libya
Mexico
Morocco
Mozambique
Nicaragua
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
South Korea
Sri Lanka
Syria
Taiwan
Turkey
The Philippines
Trinidad and Tobago
United Arab Emirates
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

Sanidad argentina en el mundo

Argentine health products around the world



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO

El constante compromiso con la ciencia, se materializa en base al trabajo de investigación de sus equipos profesionales, y a través de convenios de vinculación tecnológica con organismos oficiales y privados:

- INTA
- CONICET
- Universidades Nacionales y Privadas

Mediante estos convenios se investigan, desarrollan y prueban a campo nuevos productos que posteriormente se lanzan al mercado, bajo normas de calidad establecidas en farmacopeas nacionales e internacionales.

SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

A permanent commitment to science is made evident through the company's professional teamwork and the technological entailment agreements entered into with the following public and private entities:

- INTA (National Institute of Agricultural and Livestock Technology).
- CONICET (National Scientific and Technical Research Council).
- Public and private universities.

Through these cooperation agreements, new products are researched, developed and field-tested under quality standards established by national and international pharmacopoeias, before they can be launched to the market.

GMP/BPFPV

PRODUCTOS ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD

GMP/BPFPV

PRODUCTS MADE UNDER INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS

Ciencia que investiga

A scientific community of researchers



CONTROL DE CALIDAD

OVER trabaja bajo Normas Internacionales de Calidad BPFPV (Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Veterinarios) / GMP (Good Manufacturing Practices) certificadas por organismos oficiales del país y del exterior, que establecen un estricto control sobre materias primas, procesos y productos terminados.
Para la compañía la gestión de calidad es una herramienta fundamental para asegurar la eficacia e inocuidad de los medicamentos veterinarios.
La aplicación de estándares internacionales representa su compromiso con la sanidad y el bienestar animal.

QUALITY CONTROL

OVER works according to international quality standards (GMP – Good Manufacturing Practices) certified by official domestic and foreign authorities. These standards require a severe control over raw materials, procedures and finished products.
For the company, quality management is a basic tool to ensure the efficacy and safety of its veterinary products.
The implementation of international standards represents OVER's commitment to the animal health and welfare.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Producción de alto rendimiento social y ambientalmente responsable

El firme compromiso de OVER con la conservación de los recursos naturales, se traduce en que cada área de producción opera bajo los lineamientos de un Sistema de Gestión Ambiental propio. La tecnología de última generación aplicada en favor de la ecoeficiencia posibilita encontrar el equilibrio justo entre alta productividad, seguridad del personal y preservación ambiental.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Environmentally responsible production of high social performance.

OVER keeps a firm commitment to preserving the natural resources. Therefor, each manufacturing area works according to its own environmental management system. The state-of-the-art technology the company applies to attain the eco-efficiency allows it to find a balance between high productivity, staff safety and environmental preservation.

Buenas prácticas, buenos productos

Good practices to obtain good products



PRODUCTOS

OVER se afianza como empresa líder a nivel nacional y alcanza un sólido posicionamiento internacional en base a la eficacia de su amplia variedad de productos destinados a la prevención y tratamiento de enfermedades de grandes, medianos y pequeños animales.
Actualmente, ofrece al mercado uno de los vademécums más completos, con más de 200 productos. Esta plataforma cubre más del 90% de las necesidades del profesional veterinario y se diversifica de modo constante en base a la suma de investigación, tecnología y calidad.

Estrategia de Mercado

Una amplia red comercial estratégicamente distribuida en la Argentina y el mundo posiciona a OVER como una de las empresas líderes del mercado. Su eficiente sistema de distribución y logística garantiza la entrega de productos en forma inmediata y eficaz a cada uno de los clientes.

200 MÁS DE 200 PRODUCTOS

15 LÍNEAS DE PRODUCTOS

PRODUCTS

OVER consolidates itself as a leading company both domestically and abroad thanks to the efficacy of its large range of products intended to prevent and treat the diseases that affect large, medium-sized and small animals.
At current, the company is offering one of the most complete drug formulary that comprises more than 200 products. This portfolio covers more than 90% of any vet's needs and is constantly diversified thanks to a combination of research, technology and quality.

Market strategies

A wide commercial net strategically spread in Argentina and the whole world positions OVER as a leading company in the market. The company's efficient system of distribution and logistics ensures a fast and effective delivery of products to each customer.

200 MORE THAN 200 PRODUCTS

15 PRODUCTS LINES



1500

CLIENTES MINORISTAS

1,500 RETAILERS

90%

DE LAS NECESIDADES VETERINARIAS CUBIERTAS

COVERED 90% OF VETERINARY PROFESSIONAL NECESSITIES








55

PRESENCIA EN 55 PAÍSES DEL MUNDO

PRESENT IN 55 COUNTRIES OVER THE WORLD



BPFPV/GMP

NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD

INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS





GENTAMICINA + CEFALEXINA


METRISAN

La combinación sinérgica para el tratamiento de endometritis y metritis en bovinos



Incluye guante obstétrico y cánula intrauterina





Sistema “Flexi-Click”

Cánula flexible de alta resistencia con adaptador de goma.

over®
MEDICINA VETERINARIA

METRISAN: Gentamicin + Cephalexin. The most effective synergistic combination for the treatment of endometritis and metritis. **“Flexi-Click” system:** Highly-resistant flexible cannula, with rubber adapter.

ANTIBIÓTICOS
ANTIBIOTICS

01

Inyectables / Injectable
Amoxicilina 200 OVER
Cefalexina 200 OVER
Ceftiofur L.P.U. OVER
Ceftiofur OVER
Florfenicol 300
Gemicin 100
Overbiotic
Overbiotic L.A.
Overbiotic L.A. PLUS
Overcef S.I.
Overfloxacin
Overkin
Penicilina Estreptomicina 5.000.000 U.I.
Tilmicosina OVER 30%
Tilosina 20 OVER

Orales / Oral
Amoxicilina POLVO SOLUBLE OVER
Florfenicol PREMIX 2% OVER
Florfenicol PREMIX 20% OVER
Florfenicol SOLUCIÓN ORAL 10% OVER
Neosulf
Neosulf C
Neover
Overbiotic POLVO SOLUBLE
Overfloxacin ORAL
Oversulfa
Tilmicosina OVER CONCENTRADO ORAL
Tilmicosina PREMIX 20% OVER

Locales / Local
Gemicin SPRAY
Overbiotic 100

Intrauterinos / Intrauterine products
Metrisan
Óvulos INTRAUTERINOS OVER

Intramamarios / Intramammaries
Cefakan
Di Eritromast MASTITIS AGUDA
Lactamox
Lactamox SECADO
Lactomicin INTRAMAMARIO
Overclox M.A.
Overmast SECADO
Overseal

Antidiarreicos / Antidiarrheals
Overbiotic ANTIDIARREICO INYECTABLE
Oversulf ADI

Con Antiinflamatorios / Including Anti-inflammatories
Ceftiover MAXIUM
Overbiotic DUO
Overpen COMPUESTO L.P.U.
Overpen FORTE
Overtil FORTE
Trifect FORTE

over®

Amoxicilina
200 OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Amoxicilina trihidrato.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de enfermedades específicas e inespecíficas provocadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 20 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Amoxicillin trihydrate.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of specific and non-specific diseases caused by amoxicillin-sensitive germs.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, swine, dogs and cats.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 20 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100 ml or 250 ml.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Cefalexina
200 OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro. Sin restricción en leche.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cefalexina monohidrato.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Neumonías, pietín, metritis, abscesos, mastitis septicémicas, etc.
Ovinos: Neumonías, pietín, metritis, etc.
Porcinos: Neumonías, pododermatitis, metritis, infecciones de la piel, etc.
Caninos y felinos: Infecciones producidas por *S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis.*
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Dosis orientativa: Bovinos: 1 ml cada 28 k.p.v. **Ovinos, porcinos, caninos y felinos:** 1 ml cada 20 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic. No milk restrictions.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cefalexin.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Pneumonia, foot rot, metritis, abscesses, septicemic mastitis, etc.
Sheep: Pneumonia, foot rot, metritis, etc.
Swine: Pneumonia, pododermatitis, metritis, skin infections, etc. **Dogs and cats:** Infections caused by *S. aureus, E. coli, K. pneumoniae* and *P. mirabilis.*
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, swine, dogs and cats.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
Cattle: Suggested daily dose of 1 ml every 28 k.l.w. **Sheep, swine, dogs and cats:** Suggested daily dose of 1 ml every 20 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Ceftiofur
L.P.U. OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro. Sin restricción en carne y leche.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ceftiofur clorhidrato.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Enfermedad respiratoria bovina, infecciones por gérmenes susceptibles y pietín. **Porcinos:** Enfermedad respiratoria porcina.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Vía intramuscular profunda o subcutánea.
Dosificación:
Bovinos: 1 ml cada 22 a 45 k.p.v.
Porcinos: 1 ml cada 10 a 17 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic. No milk or meat restrictions.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ceftiofur (as hydrochlorate).....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Bovine respiratory disease, infections caused by ceftiofur-susceptible germs and foot rot.
Swine: Swine respiratory disease.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
By subcutaneous or deep intramuscular route.
Dosage:
Cattle: 1 ml every 22 to 45 k.l.w.
Swine: 1 ml every 10 to 17 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100 ml or 250 ml.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Ceftiofur
OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada frasco con polvo contiene:
Ceftiofur base (como sal sódica).....4 g
Cada frasco con solvente contiene:
Solvente estéril.....80 ml
Indicaciones:
Bovinos: Enfermedad respiratoria bovina, infecciones por gérmenes susceptibles y pietín. **Porcinos:** Enfermedad respiratoria porcina. **Equinos** (*)**:** Enfermedades infecciosas respiratorias. **Pollos:** Control de infecciones colibacilares y estafilococcicas en pollitos de 1 día de vida (mortalidad temprana de pollitos). (*) Uso exclusivo en equinos deportivos.
Especies a las que se destina:
Bovinos, porcinos, equinos y aves.
Administración: Vía intramuscular profunda. Pollitos de 1 día de vida: Vía subcutánea en la zona del cuello.
Dosificación: Bovinos: 1 ml del producto reconstituido cada 50 k.p.v. **Porcinos:** 1 ml del producto reconstituido cada 16 k.p.v. **Equinos:** 1 ml del producto reconstituido cada 25 k.p.v. **Pollos:** Un frasco de 4 g para 40.000 pollitos.
Presentación: Frascos con 4 g de polvo y frascos con 80 ml de solvente.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Each vial with powder contains:
Ceftiofur sodium salt.....4 g
Each vial with solvent contains:
Sterile solvent.....80 ml
Indications: Cattle: Bovine respiratory disease, infections caused by ceftiofur-susceptible germs and foot rot. **Swine:** Swine respiratory disease. **Horses (only sport horses):** Infectious respiratory diseases. **Chickens:** Control of colibacillary and staphylococcal infections in 1-day-old chicks (early chick mortality).
Animal species to which it is intended:
Cattle, swine, horses and poultry.
Administration: By deep intramuscular route. One-day-old chicks: By subcutaneous route in the neck area.
Dosage: Cattle: 1 ml of reconstituted product every 50 k.l.w. **Swine:** 1 ml of reconstituted product every 16 k.l.w. **Horses:** 1 ml of reconstituted product every 25 k.l.w. **Chickens:** One 4 g-vial contains doses for 40,000 chicks.
Presentation: 1 vial containing 4 g of powder and 1 vial containing 80 ml of solvent.

Florfenicol
300



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Florfenicol.....30 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio y genitourinario, diarrea de los terneros, y pietín.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Bovinos: Vía intramuscular en la tabla del cuello. **Porcinos:** Vía intramuscular.
Dosificación:
1 ml cada 15 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 25, 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Florfenicol.....30 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of infectious diseases affecting the respiratory and genito-urinary tract, diarrhea of the calves and foot rot.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
Cattle: By intramuscular route in the neck flat. **Swine:** By intramuscular route.
Dosage:
1 ml every 15 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 25, 100 or 250 ml.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Gemicin
100



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Gentamicina (*).....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
(*) Sulfato de Gentamicina expresada como base.
Indicaciones:
Bovinos: Neumonías, enteritis (diarreas), queratoconjuntivitis, metritis, mastitis por coliformes, nefritis, etc.
Equinos: Neumonías, enteritis (diarreas), septicemias de los potros por bacterias gram negativas, queratoconjuntivitis, metritis, nefritis, etc. **Porcinos:** Afecciones respiratorias, afecciones del tracto urogenital, enteritis, colibacilosis de los lechones, etc.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos y porcinos.
Administración: Vía intramuscular. Vía intrauterina para el tratamiento de metritis.
Dosificación: Vía intramuscular: 1 a 2 ml cada 50 k.p.v. **Vía intrauterina:** 20 a 25 ml diluidos en 200 a 300 ml de solución fisiológica.
Presentación: Frascos con 25 y 100 ml

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Gentamicin sulfate (base).....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Pneumonia, enteritis (diarrhea), keratoconjunctivitis, metritis, coliform mastitis, nephritis, etc. **Horses:** Pneumonia, enteritis (diarrhea), septicemias of foals by gram negative bacteria, keratoconjunctivitis, metritis, nephritis, etc. **Swine:** Respiratory diseases, genito-urinary tract diseases, enteritis, colibacillosis of piglets, etc.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses and swine.
Administration:
By intramuscular route. By intrauterine route to treat metritis.
Dosage:
By intramuscular route: 1 to 2 ml per each 50 k.l.w. **By intrauterine route:** 20 to 25 ml diluted in 200 to 300 ml of physiological solution.
Presentation:
Vials containing 25 or 100 ml.

Overbiotic



Descripción: Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato.....5,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento y control de carbunclo bacteriano, carbunclo sintomático, septicemia hemorrágica, leptospirosis, actinobacilosis, actinomicosis, hemoglobinuria bacilar, enterotoxemias, paratifosis porcina, psitacosis, anaplasmosis, brucelosis, neumonías, bronquitis, pleuritis, enteritis, infecciones del tracto genito-urinario y toda afección no específica causada por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos, felinos y aves.
Administración: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos: Vía intramuscular o subcutánea. **Felinos y aves:** Vía subcutánea.
Dosificación: Se recomienda como dosis diaria 10 mg por k.p.v. para todas las especies.
Presentación: Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Oxytetracycline hydrochloride.....5.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of bacterial carbuncle, symptomatic carbuncle, hemorrhagic septicemia, leptospirosis, actinobacillosis, actinomycosis, bacillary hemoglobinuria, enterotoxemia, porcine paratyphoid, psittacosis, anaplasmosis, brucellosis, pneumonia, bronchitis, pleuritis, enteritis, genito-urinary tract infections and non-specific diseases caused by oxytetracycline-sensitive germs.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine, dogs, cats and poultry.
Administration: Cattle, horses, sheep, swine and dogs: By intramuscular or subcutaneous route. **Cats and poultry:** By subcutaneous route.
Dosage: For all species, a daily dose of 10 mg per k.l.w. is generally recommended.
Presentation: Vials containing 100 or 250 ml.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Overbiotic L.A.



Descripción: Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina base.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Bovinos: Anaplasmosis, neumonías, leptospirosis, pietín, mastitis, metritis, carbunclo sintomático, enteritis bacteriana, artritis, heridas infectadas. **Ovinos:** Neumonías, carbunclo sintomático, pietín, mastitis, infecciones post parto, metritis. **Porcinos:** Neumonías y otras enfermedades respiratorias, leptospirosis, enteritis bacteriana, mastitis, metritis, diarrea de los lechones, infecciones post quirúrgicas y post parto, heridas infectadas.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración: Bovinos, ovinos y porcinos adultos: Vía intramuscular profunda en grandes masas musculares. **Lechones de menos de 10 k.p.v.:** Vía subcutánea.
Dosificación: Bovinos, ovinos y porcinos adultos: 1 ml cada 10 k.p.v. **Lechones de menos de 2 k.p.v.:** 0,5 ml por animal; **Cerdos de entre 2 y 10 k.p.v:** 1 ml por animal.
Presentación: Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto. Caja con 12 frascos de 10 ml cada uno.

Description: Broad spectrum antibiotic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Oxytetracycline base.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Anaplasmosis, pneumonia, leptospirosis, foot rot, mastitis, metritis, symptomatic carbuncle, bacterial enteritis, arthritis, infected wounds. **Sheep:** Pneumonia, symptomatic carbuncle, foot rot, mastitis, post-parturition infections, metritis. **Swine:** Pneumonia and other respiratory diseases, leptospirosis, bacterial enteritis, mastitis, metritis, piglet diarrhea, post-surgical and post-parturition infections, infected wounds.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep and swine.
Administration: Cattle sheep and swine: By deep intramuscular route in large muscle masses. **Piglets less than 10 k.l.w.:** By subcutaneous route.
Dosage: Cattle, sheep and swine: 1 ml every 10 k.l.w. **Piglets less than 2 k.l.w.:** 0.5 ml per animal. **Pigs between 2 and 10 k.l.w.:** 1 ml per animal.
Presentation: Vials containing 100 ml or 250 ml. Box containing 12 vials with 10 ml each.

Overbiotic
L.A. PLUS



Descripción: Antibiótico de amplio espectro y acción prolongada.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina base.....30 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Bovinos: Anaplasmosis, neumonías, leptospirosis, pietín, mastitis, metritis, carbunclo sintomático, enteritis bacteriana, artritis, heridas infectadas. **Ovinos:** Neumonías, carbunclo sintomático, pietín, mastitis, infecciones post parto, metritis. **Porcinos:** Neumonías y otras enfermedades respiratorias, leptospirosis, enteritis bacteriana, mastitis, metritis, diarrea de los lechones, infecciones post quirúrgicas y post parto, heridas infectadas.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración: Bovinos y ovinos: Vía intramuscular profunda en grandes masas musculares. **Porcinos de menos de 10 k.p.v.:** Vía subcutánea.
Dosificación: 1 ml cada 15 k.p.v.
Presentación: Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description: Long-acting broad spectrum antibiotic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Oxytetracycline base.....30 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Anaplasmosis, pneumonia, leptospirosis, foot rot, mastitis, metritis, symptomatic carbuncle, bacterial enteritis, arthritis, infected wounds. **Sheep:** Pneumonia, symptomatic carbuncle, foot rot, mastitis, post-parturition infections, metritis. **Swine:** Pneumonia and other respiratory diseases, leptospirosis, bacterial enteritis, mastitis, metritis, piglet diarrhea, post-surgical and post-parturition infections, infected wounds.
Animal species to which it is intended: Cattle, sheep and swine.
Administration:
Cattle and sheep: By deep intramuscular route in large muscle masses. **Swine weighing less than 10 k.l.w.:** By subcutaneous route.
Dosage: 1 ml every 15 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Overcef
S.I.



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula: OVERCEF S.I. 2 g
Cada frasco con polvo contiene:
Cefalexina monohidrato.....2 g
Cada frasco con solvente contiene:
Solvente para diluir.....25 ml
OVERCEF S.I. 4 g
Cada frasco con polvo contiene:
Cefalexina monohidrato.....4 g
Cada frasco con solvente contiene:
Solvente para diluir.....50 ml
Indicaciones: Bovinos: Neumonías, pietín, metritis, abscesos, mastitis septicémicas, etc. **Ovinos:** Neumonías, pietín, metritis, etc. **Porcinos:** Neumonías, pododermatitis, metritis, infecciones de la piel, etc.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración: Vía intramuscular o subcutánea. En bovinos puede administrarse vía intramamaria.
Dosificación: Dosis orientativa: Bovinos: 10 ml cada 100 k.p.v.; 2,5 a 5 ml por vía intramamaria. **Ovinos y porcinos:** 2,5 ml cada 20 k.p.v.
Presentación: Frascos con 2 g de polvo y 25 ml de solvente. Frascos con 4 g de polvo y 50 ml de solvente.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula: OVERCEF S.I. 2 g
Each vial with powder contains:
Cefalexin monohydrate.....2 g
Each vial with solvent contains:
Solvent for dilution purposes.....25 ml
OVERCEF S.I. 4 g
Each vial with powder contains:
Cefalexin monohydrate.....4 g
Each vial with solvent contains:
Solvent for dilution purposes.....50 ml
Indications: Cattle: Pneumonia, foot rot, metritis, abscesses, septicemic mastitis, etc. **Sheep:** Pneumonia, foot rot, metritis, etc. **Swine:** Pneumonia, pododermatitis, metritis, skin infections, etc.
Animal species to which it is intended: Cattle, sheep and swine.
Administration: By intramuscular or subcutaneous route. In cattle, it can be administered by intramammary route.
Dosage: Suggested dose for cattle: administer 10 ml every 100 k.l.w.; 2.5 to 5 ml by intramammary route. **Suggested dose for sheep and swine:** administer 2.5 ml every 20 k.l.w.
Presentation: Vials containing 2 g of powder and vials containing 25 ml of solvent. Vials containing 4 g of powder and vials containing 50 ml of solvent.

Overfloxacin



Descripción:
Quimioterápico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Enrofloxacina.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Colibacilosis, pasteurelosis, salmonelosis, estafilococosis, mycoplasmosis y enfermedades bacterianas secundarias a procesos virales. **Porcinos**: Diarreas, colibacilosis, salmonelosis, mycoplasmosis y bronconeumonías. **Caninos y felinos:** Tratamiento de infecciones en los órganos digestivos, respiratorios y urogenitales, conductos auditivos externos, y afecciones dérmicas primarias y secundarias.
Especies a las que se destina:
Bovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación: Bovinos y porcinos: 0,5 ml a 1 ml cada 10 k.p.v. cada 24 hs. durante 5 días. **Caninos y felinos:** 1 ml cada 10 k.p.v. cada 24 hs. durante 5 días.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Chemotherapeutic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Enrofloxacin.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Colibacillosis, pasteurellosis, salmonellosis, staphylococcosis, mycoplasmosis and bacterial diseases secondary to viral processes. **Swine:** Diarrhea, colibacillosis, salmonellosis, mycoplasmosis and bronchopneumonia. **Dogs and cats:** Treatment of infections affecting the digestive, respiratory and genito-urinary organs and the external auditory ducts; primary and secondary dermal diseases.
Animal species to which it is intended:
Cattle, swine, dogs and cats.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
Cattle and swine: 0.5 to 1 ml every 10 k.l.w. per day, during 5 days.
Cats and dogs: 1 ml every 10 k.l.w. per day, during 5 days.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Overkin



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Quimioterápico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Enrofloxacina.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infecciones provocadas por gérmenes gram positivos, gram negativos y mycoplasmas.
Especies a las que se destina:
Bovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Bovinos y porcinos: 1 ml cada 40-80 k.p.v. **Caninos y felinos:** 0,1 ml cada 8 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 100 y 250 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Chemotherapeutic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Enrofloxacin.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of infections caused by gram positive, gram negative and mycoplasma germs.
Animal species to which it is intended:
Cattle, swine, dogs and cats.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
Cattle and swine: 1 ml every 40 to 80 k.l.w. **Dogs and cats:** 0.1 ml every 8 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 100 or 250 ml.

Penicilina estreptomicina
5.000.000 U.I.



Descripción: Antibiótico de amplio espectro bactericida. Analgésico. Antitérmico.
Fórmula: Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Sódica.....2.500.000 U.I.
Penicilina G Procaínica.....1.250.000 U.I.
Penicilina G Benzatínica.....1.250.000 U.I.
Sulfato de estreptomicina.....2 g
Citrato de sodio anhidro.....0,004 g
Dipirona.....1 g
Cada frasco con 25 ml de solvente contiene:
Clorhidrato de Lidocaína.....0,06 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Para el tratamiento de las infecciones provocadas por gérmenes sensibles a la Penicilina y/o a la Estreptomicina, actinomicosis, actinobacilosis, adenitis equina, leptospirosis, carbunclo bacteriano, carbunclo sintomático, gangrena gaseosa, septicemia hemorrágica, erisipela, neumonías, enteritis, nefritis, mastitis, tétanos e infecciones secundarias a virosis.
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos.
Administración: Vía intramuscular profunda.
Dosificación: 10.000 a 20.000 U.I. de penicilina por k.p.v. según la gravedad de la afección.
Presentación: Caja con 6 frascos con polvo y 6 frascos con solvente.

Description: Broad spectrum bactericidal antibiotic. Analgesic. Antithermic.
Formula: Each vial with powder contains:
Penicillin G sodium.....2,500,000 I.U.
Penicillin G procaine.....1,250,000 I.U.
Penicillin G benzathine.....1,250,000 I.U.
Streptomycin sulfate.....2 g
Anhydrous sodium citrate.....0.004 g
Dipyrone.....1 g
Each vial with 25 ml of solvent contains:
Lidocaine hydrochloride.....0.06 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: For the treatment of infections caused by penicillin and/or streptomycin-sensitive germs. Actinomycosis. Actinobacillosis. Equine adenitis. Leptospirosis. Bacterial carbuncle. Symptomatic carbuncle. Gas gangrene. Hemorrhagic septicemia. Erysipelas. Pneumonia. Enteritis. Nephritis. Mastitis. Tetanus. Infections secondary to viral infections.
Animal species to which it is intended: Cattle, horses, sheep, swine and dogs.
Administration: By deep intramuscular route.
Dosage: 10,000 to 20,000 I.U. of penicillin every k.l.w., according to the disease severity.
Presentation: Box containing 6 vials with powder and 6 vials with solvent.

Antibióticos. Inyectables | Antibiotics. Injectable

Tilmicosina
OVER 30%



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Tilmicosina fosfato.....30 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de neumonía, queratoconjuntivitis y pietín.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Neumonía: 1 ml cada 30 k.p.v.
Queratoconjuntivitis y pietín: 1 ml cada 30 a 60 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Tilmicosin (as phosphate).....30 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
For the treatment of pneumonia, keratoconjunctivitis and foot rot.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Pneumonia: 1 ml every 30 k.l.w.
Keratoconjunctivitis and foot rot: 1 ml every 30 to 60 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10 or 100 ml.

Tilosina
20 OVER



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Tilosina base.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Neumonías, pietín, mastitis, metritis, septicemia hemorrágica, leptospirosis, enteritis, etc. **Porcinos:** Paratifosis, neumonías, disentería vibriónica, infecciones secundarias a virosis.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Vía intramuscular.
Dosificación:
Bovinos: 1 a 2,5 ml cada 50 k.p.v. por día.
Porcinos: 0,05 a 0,25 ml cada 5 k.p.v. por día.
Presentación:
Frascos con 25, 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Tylosin base.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Pneumonias, foot rot, mastitis, metritis, hemorrhagic septicemia, leptospirosis, enteritis, etc. **Swine:** Paratyphoid, pneumonias, vibrionic dysentery, infections secondary to viral infections.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
By intramuscular route.
Dosage:
Cattle: 1 to 2.5 ml every 50 k.l.w. per day.
Swine: 0.05 to 0.25 ml every 5 k.l.w. per day.
Presentation:
Vials containing 25, 100 or 250 ml.

Amoxicilina
POLVO SOLUBLE OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Amoxicilina trihidrato.....25 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infecciones de los sistemas urogenital, respiratorio y digestivo.
Especies a las que se destina:
Porcinos y aves.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Porcinos: 10 mg por k.p.v. En el agua de bebida: 2 a 4 g cada 10 litros de agua. En la ración de alimento: 1 g cada 25 k.p.v.
Aves: 8 a 16 mg por k.p.v. por día. En el agua de bebida: 1 g por litro de agua.
Presentación:
Bolsa con 1 kg y balde con 5 kg de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Amoxicillin (as trihydrate).....25 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of infections of the genito-urinary, respiratory and digestive systems.
Animal species to which it is intended:
Swine and poultry.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Swine: 10 mg every k.l.w. In the drinking water: 2 to 4 g every 10 liters of water. In the food: 1 g every 25 k.l.w.
Poultry: 8 to 16 mg per k.l.w. per day. In the drinking water: 1 g every 1 liter of water.
Presentation:
Bag containing 1 kg. Bucket containing 5 kg.

Florfenicol
PREMIX 2% OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Florfenicol.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infecciones respiratorias.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento.
Dosificación:
2 kg por tonelada de alimento (40 ppm). En casos de poliserositis o estreptococosis la dosis debe elevarse a 3 kg por tonelada de alimento.
Presentación:
Bolsa y pote con 1 kg de contenido neto. Baldes con 5 y 10 kg de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Florfenicol.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of respiratory infections.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Administration:
By oral route, mixed with the food.
Dosage:
2 kg per food ton (40 ppm). In case of polyserositis or streptococcosis, the dose has to be increased to 3 kg per food ton.
Presentation:
Bag and pot containing 1 kg. Bucket containing 5 or 10 kg.

Antibióticos. Orales | Antibiotics. Oral

Florfenicol
PREMIX 20% OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Florfenicol.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infecciones respiratorias.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento.
Dosificación:
200 g por tonelada de alimento (40 ppm).
Presentación:
Bolsa y pote con 1 kg de contenido neto. Baldes con 5 y 10 kg de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Florfenicol.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of respiratory infections.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Administration:
By oral route, mixed with the food.
Dosage:
200 g per food ton (40 ppm).
Presentation:
Bag and pot containing 1 kg. Buckets containing 5 or 10 kg.

Florfenicol
SOLUCIÓN ORAL 10% OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Florfenicol.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infecciones respiratorias en cerdos e infecciones bacterianas en pollos parrilleros y pollitas de reemplazo, tanto para reproductoras como para gallinas de postura.
Especies a las que se destina:
Porcinos y aves.
Administración:
Vía oral diluido en agua.
Dosificación:
Porcinos: 1,7 a 2 mg por k.p.v. **Aves:** 20 mg por k.p.v. por día.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Florfenicol.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of respiratory infections in swine. Treatment of bacterial infections in broiler chickens and in pullets intended to replace breeding and laying hens.
Animal species to which it is intended:
Swine and poultry.
Administration:
By oral route, diluted in the drinking water.
Dosage:
Swine: 1,7 to 2 mg per k.l.w. **Poultry:** 20 mg per k.l.w. per day.
Presentation:
Bottle containing 1 liter.

Neosulf



Descripción:
Antidiarreico oral.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ftalilsulfatiazol.....2,5 g
Sulfato de estreptomicina.....0,5 g
Dimetilpolisiloxano al 10%.....1 g
Caolín coloidal.....1,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de diarreas polimicrobianas, colibacilosis, enteritis por intoxicación alimenticia, coadyuvante en el tratamiento de enteritis parasitarias y víricas.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 ml por k.p.v.
Presentación:
Frascos con 250 y 500 ml de contenido neto.

Description:
Antidiarrheal.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Phthalylsulfathiazole.....2.5 g
Streptomycin sulfate.....0.5 g
Dimethylpolysiloxane at 10%.....1 g
Colloidal kaolin.....1.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of polymicrobial diarrhea, colibacillosis and enteritis caused by food poisoning. Coadjuvant in the treatment of parasitic and viral enteritis.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine, sheep, dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 ml per k.l.w.
Presentation:
Vials containing 250 or 500 ml.

Neosulf C



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula: Cada comprimido contiene:
Sulfametoxazol.....400 mg
Trimetoprima.....80 mg
Vitamina C.....150 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Pietín, coccidiosis, difteria de los terneros, poliartritis, infecciones respiratorias, diarreas (blanca y con sangre). **Equinos:** Infecciones del tracto respiratorio superior, poliartritis en el potrillo. **Ovinos:** Coccidiosis, pietín, enteritis. **Porcinos:** Neumonía, rinitis. **Caninos:** Infecciones del tracto urinario, tracto respiratorio y de la piel.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 comprimido cada 32 k.p.v.
Presentación:
Caja con 20 blisters de 10 comprimidos cada uno. Dispenser con 50 blisters de 10 comprimidos cada uno. Pote con 100 comprimidos.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Each tablet contains:
Sulfamethoxazole.....400 mg
Trimethoprim.....80 mg
Vitamin C.....150 mg
Formulation agents..... q.s.
Indications:
Cattle: Foot rot, coccidiosis, calf diphtheria, polyarthritis, respiratory infections, diarrhea (white and bloody). **Horses:** Infections of the upper respiratory tract, polyarthritis of the foal. **Sheep:** Coccidiosis, foot rot, enteritis. **Swine:** Pneumonia, rhinitis. **Dogs:** Urinary tract infections, skin infections, respiratory tract infections.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine and dogs.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 tablet every 32 k.l.w.
Presentation:
Pot containing 100 tablets. Dispenser containing 50 blisters with 10 tablets each. Box containing 20 blisters with 10 tablets each.

Antibióticos. Orales | Antibiotics. Oral

Neover



Descripción:
Antibiótico aminoglucósido de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Neomicina sulfato.....50 g
Agentes de formulación.....c.s.p
Indicaciones:
Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, disentería vibriónica, enfermedad de los edemas. **Aves:** Colibacilosis, diarreas inespecíficas y salmonelosis. El espectro de acción incluye: *Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Campylobacter spp, Pseudomona spp, Klebsiella spp, Shigella spp, Proteus spp, Clostridium spp, Bacillus anthracis, Mycobacterium spp.*
Especies a las que se destina:
Aves y porcinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento o el agua de bebida.
Dosificación:
10 mg por k.p.v.
Presentación:
Bolsas con 100 g, 1, 5, 10, 20 y 25 kg de contenido neto.

Description:
Aminoglycoside antibiotic featuring a broad spectrum of activity.
Formula:
Each 100 g, it contains:
Neomycin sulfate..... 50 g
Formulation agents..... q.s.
Indications:
Swine: Colibacillosis, salmonellosis, vibrio dysentery, edema disease.
Poultry: Colibacillosis, salmonellosis and non-specific diarrhea. The spectrum of action includes: *Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Campylobacter spp, Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Shigella spp, Proteus spp, Clostridium spp, Bacillus anthracis and Mycobacterium spp.*
Animal species to which it is intended:
Poultry and swine.
Administration:
By oral route, mixed with the food or drinking water.
Dosage:
10 mg per k.l.w.
Presentation:
Bags containing 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg or 25 kg.

Overbiotic
POLVO SOLUBLE



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Clorhidrato de oxitetraciclina.....5,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos, ovinos y porcinos: Prevención y tratamiento de enteritis infecciosas, neumonías, bronquitis, pleuritis y complicaciones bacterianas asociadas a virosis. **Aves:** Cólera, tifus, coriza y otras enfermedades de las vías respiratorias, pullorosis, espiroquetosis, enteritis inespecíficas, complicaciones bacterianas asociadas a virosis.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos, porcinos y aves.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Terneros, corderos y porcinos: 5 a 10 g cada 25 k.p.v. **Aves:** 5 g cada 2 litros de agua.
Presentación:
Bolsa con 1 kg de contenido neto. Balde con 5 kg de contenido neto.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Oxytetracycline hydrochloride.....5.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle, sheep and swine: Prevention and treatment of infectious enteritis, pneumonia, bronchitis, pleuritis and bacterial complications associated with viral infections. **Poultry:** Cholera, typhus, coryza and other respiratory diseases, pullorum disease, spirochetosis, non-specific enteritis, bacterial complications associated with viral infections.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, swine and poultry.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Calves, lambs and swine: 5 to 10 g every 25 k.l.w. **Poultry:** 5 g every 2 liters of water.
Presentation:
Bag containing 1 kg. Bucket containing 5 kg.

Antibióticos. Orales | Antibiotics. Oral

Overfloxacin
ORAL



Descripción:
Quimioterápico. Antibacteriano.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Enrofloxacina.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de colibacilosis, salmonelosis, mycoplasmosis, pasteurelosis y coriza infecciosa.
Especies a las que se destina:
Aves.
Administración:
Vía oral, diluido en agua.
Dosificación:
0,5 ml por litro de agua.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto.

Description:
Chemotherapeutic. Antibacterial.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Enrofloxacin.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of colibacillosis, salmonellosis, mycoplasmosis, pasteurellosis and infectious coryza.
Animal species to which it is intended:
Poultry.
Administration:
By oral route, diluted in water.
Dosage:
0.5 ml per liter of the drinking water.
Presentation:
Bottle containing 1 liter.

Oversulfa



Descripción:
Bacteriostático. Coccidiostático.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Sulfadimetilpirimidina sódica (Sulfametazina sódica).....12,5 g
Sulfito de sodio.....0,25 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Bovinos: Metritis, septicemias, neumonías, coccidiosis, colibacilosis, pietín, conjuntivitis, mastitis, etc. **Equinos:** Adenitis equina, neumonías, enteritis bacilares, septicemias, etc. **Ovinos:** Pietín, septicemias, enteritis, mastitis, coccidiosis, etc. **Porcinos:** Enteritis, septicemias, neumonías, etc. **Caninos y felinos:** Neumonías, enteritis, septicemias, coccidiosis, etc. **Aves:** Coccidiosis, pullorosis, cólera, coriza, moquillo, etc.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos, felinos y aves.
Administración: Vía oral.
Dosificación: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos: 1,5 a 2 ml por k.p.v. el primer día, y 1 ml por k.p.v. el segundo y tercer día. **Aves:** 10 ml por litro de agua de bebida.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Bacteriostatic. Coccidiostat.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Sulfadimethylpyrimidine sodium (sulfamethazine sodium).....12.5 g
Sodium sulfite.....0.25 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Metritis, septicemia, pneumonia, coccidiosis, colibacillosis, foot rot, conjunctivitis, mastitis, etc. **Horses:** Equine adenitis, pneumonia, bacillary enteritis, septicemia, etc. **Sheep:** Foot rot, septicemia, enteritis, mastitis, coccidiosis, etc. **Swine:** Enteritis, septicemia, pneumonia, etc. **Dogs and cats:** Pneumonia, enteritis, septicemia, coccidiosis, etc. **Poultry:** Coccidiosis, pullorum disease, cholera, coryza, pip, etc.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine, dogs, cats and poultry.
Administration: By oral route.
Dosage: Poultry: 10 ml per liter of the drinking water. **Horses, cattle, sheep, swine, dogs and cats:** 1.5 to 2 ml every k.l.w. for the first day and 1 ml every k.l.w. for the second and third day.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Antibióticos. Orales | Antibiotics. Oral

Tilmicosina

OVER CONCENTRADO ORAL



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Tilmicosina fosfato.....25 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de enfermedades respiratorias.
Especies a las que se destina:
Porcinos y aves.
Administración:
Vía oral diluido en el agua de bebida.
Dosificación:
Dosis orientativa: 4 a 5,3 ml cada 10 litros de agua.
Presentación:
Frasco con 250 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Tilmicosin phosphate.....25 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
For the treatment of respiratory diseases.
Animal species to which it is intended:
Poultry and swine.
Administration:
By oral route, diluted in the drinking water.
Dosage:
Suggested dose: 4 to 5.3 ml every 10 liters of water.
Presentation:
Vial containing 250 ml.

Tilmicosina
PREMIX 20% OVER



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Tilmicosina fosfato.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control y tratamiento de enfermedades respiratorias.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento seco.
Dosificación:
1 a 2 kg por tonelada de alimento.
Presentación:
Bolsa con 1 kg de contenido neto. Balde con 5 kg de contenido neto.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Tilmicosin (as phosphate).....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of respiratory diseases.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Administration:
By oral route, mixed with the dry food.
Dosage:
1 to 2 kg per food ton.
Presentation:
Bag containing 1 kg. Bucket containing 5 kg.

Gemicin
SPRAY



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Gentamicina (*).....0,3 g
Lidocaína clorhidrato.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
(*) Sulfato de Gentamicina expresada como base.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de infecciones locales.
Especies a las que se destina:
Bovinos, porcinos, equinos deportivos, ovinos y caprinos.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
El volumen de dosis a aplicar dependerá de la superficie a tratar y el criterio del profesional actuante.
Presentación:
Frasco con 250 ml de contenido neto, con aplicador.

Description:
Broad spectrum antibiotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Gentamicin sulfate (base).....0.3 g
Lidocaine hydrochloride.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of local infections.
Animal species to which it is intended:
Cattle, swine, sport horses, sheep and goats.
Administration:
Local use.
Dosage:
The dose volume to be applied depends on the area to be treated and the vet's discretion.
Presentation:
Vial containing 250 ml and an applicator.

Overbiotic
100



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato.....100 g
Indicaciones:
Prevención y tratamiento de enfermedades podales.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
2 g dependiendo de la gravedad de la afección y el criterio del profesional.
Presentación:
Bolsa con 1 kg de contenido neto.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Oxytetracycline hydrochloride.....100 g
Indications:
Prevention and treatment of foot diseases.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Local use.
Dosage:
2 g, depending on the disease severity and the vet's discretion.
Presentation:
Bag containing 1 kg.

Metrisan



Descripción:
Antibiótico. Quimioterápico.
Fórmula:
Cada jeringa de 20 ml contiene:
Gentamicina sulfato.....200 mg
Cefalexina monohidrato.....600 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención y tratamiento de endometritis subaguda y crónica.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intrauterina.
Dosificación:
1 jeringa por animal.
Presentación:
Caja con 10 jeringas de 20 ml de contenido neto cada una. Incluye 10 cánulas y 10 guantes.

Description:
Antibiotic. Chemotherapeutic.
Formula:
Each 20 ml-syringe contains:
Gentamicin sulfate.....200 mg
Cefalexin monohydrate.....600 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention and treatment of sub-acute and chronic endometritis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intrauterine route.
Dosage:
1 syringe per animal.
Presentation:
Box containing 10 (ten) 20 ml-syringes, 10 cannulas and 10 gloves.

Óvulos
INTRAUTERINOS OVER



Descripción:
Antibiótico de amplio espectro.
Fórmula:
Cada óvulo contiene:
Cefalexina.....600 mg
Gentamicina sulfato.....200 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de endometritis subaguda y crónica.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intrauterina.
Dosificación:
En aplicación local. La dosis no está relacionada con el peso y/o edad del animal a tratar.
Presentación:
Caja con 60 óvulos. Dispenser de 50 sobres con 2 óvulos cada uno.

Description:
Broad-spectrum antibiotic.
Formula:
Each ovule contains:
Cefalexin.....600 mg
Gentamicin (as sulfate).....200 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of subacute and chronic endometritis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intrauterine route.
Dosage:
In local application, the dose is not related to the weight and/or age of the treated animal.
Presentation:
Box containing 60 ovules. Dispenser containing 100 ovules (50 pouches with 2 ovules each).

Cefakan



Descripción:
Antibiótico intramamario.
Fórmula:
Cada jeringa de 5 g contiene:
Cefalexina.....0,2 g
Kanamicina sulfato.....100.000 U.I.
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de mastitis clínica.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
1 jeringa por cuarto.
Presentación:
Caja con 12 jeringas de 5 g de contenido neto cada una. Balde con 60 jeringas.

Description:
Intramammary antibiotic.
Formula:
Each 5 g-syringe contains:
Cefalexin.....0.2 g
Kanamycin sulfate.....100,000 I.U.
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of clinical mastitis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
1 syringe per quarter.
Presentation:
Box containing 12 (twelve) 5 g-syringes. Bucket containing 60 syringes.

Di Eritromast
MASTITIS AGUDA



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula:
Cada jeringa de 10 g contiene:
Eritromicina estolato.....0,25 g
Dihidroestreptomicina sulfato.....0,25 g
Alfaquimotripsina..... 0,01 g
Dexametasona 21 fosfato..... 0,001 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de mastitis clínicas.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
1 jeringa por cuarto.
Presentación:
Caja con 12 jeringas de 10 g de contenido neto cada una. Balde con 60 jeringas.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula:
Each 10 g-syringe contains:
Erythromycin estolate.....0.25 g
Dihydrostreptomycin sulfate.....0.25 g
Alpha-chymotrypsin.....0.01 g
Dexamethasone 21 phosphate.....0.001 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of clinical mastitis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
Apply one syringe per each affected quarter.
Presentation:
Box containing 12 (twelve) 10 g-syringes. Bucket containing 60 syringes.

Antibióticos. Intramamarios | Antibiotics. Intramammaries

Lactamox



Descripción:
Asociación antibiótica.
Fórmula:
Cada jeringa de 10 ml contiene:
Clavulanato de potasio.....50 mg
Amoxicilina sódica.....200 mg
Prednisolona.....10 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras lactando.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
1 jeringa por cuarto cada 12 horas, aplicando en total 3 jeringas.
Presentación:
Caja con 12 jeringas de 10 ml de contenido neto cada una. Balde con 60 jeringas.

Description:
Antibiotic association.
Formula:
Each 10 ml-syringe contains:
Potassium clavulanate.....50 mg
Amoxicillin sodium.....200 mg
Prednisolone.....10 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of clinical mastitis in lactating dairy cows.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
Administer one syringe per quarter every 12 hours, for a total of three syringes.
Presentation:
Box containing 12 (twelve) 10 ml-syringes. Bucket containing 60 syringes.

Lactamox
SECADO



Descripción:
Asociación antibiótica.
Fórmula:
Cada jeringa de 6 g contiene:
Cloxacilina (*) .....600 mg
Ampicilina trihidrato.....300 mg
Agentes de formulación.....c.s.
(*) como sal Benzatínica.
Indicaciones:
Para ser administrada al momento del secado.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
1 jeringa por cuarto.
Presentación:
Caja con 12 jeringas de 6 g de contenido neto cada una. Baldes con 60 y 100 jeringas.

Description:
Antibiotic association.
Formula:
Each 6 g-syringe contains:
Cloxacillin (as benzathine salt).....600 mg
Ampicillin trihydrate.....300 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
To be administered at the time of drying.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
One syringe per quarter.
Presentation:
Box containing 12 (twelve) 6 g-syringes.
Bucket containing 60 and 100 syringes.

Antibióticos. Intramamarios | Antibiotics. Intramammaries

Lactomicin
INTRAMAMARIO



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Penicilina G sódica.....2.000.000 U.I.
Penicilina G procaínica.....2.000.000 U.I.
Sulfato de estreptomicina....1.500.000 U.I.
Mentol.....0,5 g
Acetato de dexametasona.....0,01 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas en el momento del secado.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
1 jeringa por cuarto.
Presentación:
Caja con 12 jeringas de 10 ml de contenido neto cada una. Balde con 60 jeringas.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Penicillin G sodium.....2,000,000 I.U.
Penicillin G procaine.....2,000,000 I.U.
Streptomycin sulfate.....1,500,000 I.U.
Menthol.....0.5 g
Dexamethasone acetate.....0.01 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of clinical and sub-clinical mastitis at the time of drying.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
One syringe per quarter.
Presentation:
Box containing 12 (twelve) 10 ml-syringes.
Bucket containing 60 syringes.

Overclox
M.A.



Descripción:
Antibiótico intramamario.
Fórmula:
Cada jeringa de 5 g contiene:
Cloxacilina sódica.....200 mg
Ampicilina sódica.....75 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de mastitis clínicas.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
1 jeringa por cuarto.
Presentación:
Caja con 12 jeringas de 5 g de contenido neto cada una. Balde con 60 jeringas.

Description:
Intramammary antibiotic.
Formula:
Every 5 g-syringe contains:
Cloxacillin sodium.....200 mg
Ampicillin sodium.....75 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of clinical mastitis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
1 syringe per quarter.
Presentation:
Box containing 12 (twelve) 5 g-syringes. Bucket containing 60 syringes.

Antibióticos. Intramamarios | Antibiotics. Intramammaries

Overmast
SECADO



Descripción:
Antibiótico. Quimioterápico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Tilosina tartrato.....5 g
Sulfametazina sódica.....5 g
Dexametasona acetato.....0,01 g
Alfaquimotripsina.....0,1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención y tratamiento de mastitis en el momento del secado.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramamaria.
Dosificación:
5 a 10 ml por cuarto.
Presentación:
Frasco con 250 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic. Chemotherapeutic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Tylosin tartrate.....5 g
Sulfamethazine sodium.....5 g
Dexamethasone acetate.....0.01 g
Alpha-chymotrypsin.....0.1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention and treatment of subclinical mastitis at the time of drying.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramammary route.
Dosage:
5 to 10 ml per quarter.
Presentation:
Vial containing 250 ml.

Overseal



Descripción:
Sellador interno de pezones.
Fórmula:
Cada jeringa de 4 g contiene:
Bismuto subnitrato.....2,6 g
Clorhexidina gluconato.....0,02 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Actúa como barrera física contra bacterias con el objeto de prevenir nuevas infecciones intramamarias en el período de secado.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
Una jeringa por cuarto.
Presentación:
Caja conteniendo 24 jeringas de 4 g de contenido neto cada una.

Description:
Internal teat sealant.
Formula:
Every 4 g-syringe contains:
Bismuth subnitrate.....2.6 g
Chlorhexidine gluconate.....0.02 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It acts as a physical barrier against bacteria in order to prevent new intramammary infections during the drying period.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Local use.
Dosage:
1 syringe per quarter.
Presentation:
Box containing 24 (twenty-four) 4 g-syringes.

Overbiotic
ANTIDIARREICO INYECTABLE



Descripción:
Antibiótico. Antidiarreico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Loperamida clorhidrato.....0,04 g
Oxitetraciclina clorhidrato.....5,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de diarreas agudas y crónicas por causas infecciosas en general: colibacilosis, salmonellosis, enteritis bacterianas y virales complicadas.
Especies a las que se destina:
Equinos deportivos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50 y 100 ml de contenido neto. Caja conteniendo 12 frascos de 10 ml de contenido neto cada uno.

Description:
Antibiotic. Antidiarrheal.
Formula:
Each 100 ml, it contains:
Loperamide hydrochloride.....0.04 g
Oxytetracycline hydrochloride.....5.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of acute and chronic diarrhea due to infectious causes in general: colibacillosis, salmonellosis, and complicated bacterial and viral enteritis.
Animal species to which it is intended:
Sport horses.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50 or 100 ml. Box containing 12 vials of 10 ml each.

Oversulf
ADI



Descripción:
Antibiótico. Antidiarreico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Trimetoprima.....4 g
Sulfametoxazol.....20 g
Loperamida.....0,05 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de infecciones gastrointestinales, septicemias, complicaciones bacterianas de enfermedades virales con síntomas de diarreas.
Especies a las que se destina:
Equinos (potrillos), caninos y felinos.
Administración:
Equinos: Vía intramuscular profunda.
Caninos y Felinos: Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
Equinos: 0,6 ml cada 10 k.p.v. **Caninos y felinos:** 1,2 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic. Antidiarrheal.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Trimethoprim.....4 g
Sulfamethoxazole.....20 g
Loperamide.....0.05 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal infections, septicemia and bacterial complications of viral diseases with symptoms of diarrhea.
Animal species to which it is intended:
Horses (colts), dogs and cats.
Administration:
Horses: by deep intramuscular route.
Dogs and cats: by subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
Horses: 0.6 ml every 10 k.l.w.
Dogs and cats: 1.2 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50 or 100 ml.

Ceftiover
MAXIUM



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula:
Cada frasco con polvo contiene:
Ceftiofur base (como sal sódica).....2 g
Meloxicam.....0,3 g
Cada frasco con solvente contiene:
Solvente estéril.....25 ml
Indicaciones:
Bovinos: Pietín, endometritis, enfermedad respiratoria bovina.
Porcinos: Enfermedad respiratoria porcina, endometritis. **Equinos:** Enfermedad respiratoria de los equinos.
Especies a las que se destina:
Bovinos, porcinos y equinos.
Administración:
Bovinos: Vía subcutánea. **Porcinos:** Vía intramuscular. **Equinos:** Vía intramuscular profunda.
Dosificación:
5 ml de producto reconstituido cada 100 k.p.v.
Presentación:
Caja con un frasco con 2 g de polvo y un frasco con 25 ml de solvente.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula:
Each vial with powder contains:
Ceftiofur sodium salt.....2 g
Meloxicam.....0.3 g
Each vial with solvent contains:
Sterile solvent.....25 ml
Indications:
Cattle: Foot rot, endometritis, bovine respiratory disease. **Swine:** Swine respiratory disease, endometritis.
Horses: Equine respiratory disease.
Animal species to which it is intended:
Cattle, swine and horses.
Administration:
Cattle: By subcutaneous route. **Swine:** By intramuscular route. **Horses:** By deep intramuscular route.
Dosage:
5 ml of reconstituted product every 100 k.l.w.
Presentation:
Box containing 1 vial with 2 g of powder and 1 vial with 25 ml of solvent.

Overbiotic
DUO



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina clorhidrato.....20 g
Meloxicam.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.p.
Indicaciones: Bovinos: Neumonías, pietín, metritis, septicemia, carbunclo sintomático, enteritis bacteriana, actinobacilosis, anaplasmosis, leptospirosis, infecciones articulares y umbilicales, prevención y tratamiento de infecciones genitales u obstétricas, heridas infectadas. **Ovinos:** Neumonías, pietín, prevención de infecciones post parto, carbunclo sintomático, edema maligno, enterotoxemia, gangrena gaseosa, actinobacilosis, nefritis, cistitis, mastitis. **Porcinos:** Neumonías por Pasteurela, bronconeumonía, síndrome MMA, leptospirosis, rinitis atrófica, diarrea de los lechones.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración: Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación: 1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación: Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Oxytetracycline hydrochloride.....20 g
Meloxicam.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Pneumonia, foot rot, metritis, septicemia, symptomatic carbuncle, bacterial enteritis, actinobacillosis, anaplasmosis, leptospirosis, articular and umbilical infections, prevention and treatment of genital or obstetrical infections, infected wounds. **Sheep:** Pneumonia, foot rot, prevention of post-parturition infections, symptomatic carbuncle, malignant edema, enterotoxemia, gas gangrene, actinobacillosis, nephritis, cystitis, mastitis. **Swine:** Pneumonia caused by Pasteurella, bronchopneumonia, mastitis-metritis-agalactia syndrome, leptospirosis, atrophic rhinitis, piglet diarrhea.
Animal species to which it is intended: Cattle, sheep and swine.
Administration: By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage: 1 ml every 10 k.l.w.
Presentation: Vials containing 100 or 250 ml.

Antibióticos. Antiinflamatorios
Antibiotics. Anti-inflammatory

Overpen
COMPUESTO LPU



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Penicilina G procaínica.....10.000.000 UI
Penicilina G benzatínica.....10.000.000 UI
Dihidroestreptomicina sulfato.....20 g
Meloxicam.....0,6 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de neumonías bacterianas, metritis, peritonitis, infecciones puerperales, tétanos, septicemias, infecciones bacterianas secundarias asociadas a infecciones virales, heridas infectadas e infecciones post operatorias.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos deportivos y porcinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 25, 50, 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Penicillin G procaine.....10,000,000 IU
Penicillin G benzathine.....10,000,000 IU
Dihydrostreptomycin sulfate.....20 g
Meloxicam.....0.6 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of bacterial pneumonia, metritis, peritonitis, puerperal infections, tetanus, septicemia, secondary bacterial infections associated with viral infections, infected wounds and postoperative infections.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sport horses and swine.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 25, 50, 100 or 250 ml.

Overpen
FORTE



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula:
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G sódica.....5.000.000 UI
Penicilina G procaínica.....5.000.000 UI
Estreptomicina sulfato.....3.750.000 UI
Meloxicam.....0,3 g
Cada frasco con 35 ml de solvente contiene:
Lidocaína.....0,35 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Enfermedades respiratorias del bovino, enfermedades respiratorias de los terneros, onfalitis, artritis séptica, colibacilosis, salmonelosis. **Equinos:** Metritis, artritis séptica, poliartritis de los potrillos, infecciones respiratorias en general, neumonías por *Rhodococcus equi.*
Especies a las que se destina:
Bovinos y equinos.
Administración: Vía intramuscular.
Dosificación: 1 frasco cada 500 k.p.v.
Presentación: Caja conteniendo un frasco con polvo y un frasco con solvente.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula:
Each vial with powder contains:
Penicillin G sodium.....5,000,000 IU
Penicillin G procaine.....5,000,000 IU
Streptomycin sulfate.....3,750,000 IU
Meloxicam.....0.3 g
Each vial with 35 ml of solvent contains:
Lidocaine.....0.35 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Respiratory diseases of cattle, respiratory diseases of calves, omphalitis, septic arthritis, colibacillosis, salmonellosis.
Horses: Metritis, septic arthritis, foal polyarthritis, general respiratory infections, *Rhodococcus equi* pneumonia.
Animal species to which it is intended:
Cattle and horses.
Administration:
By intramuscular route.
Dosage:
1 vial every 500 k.l.w.
Presentation:
Box containing 1 vial with powder and 1 vial with solvent.

Overtil
FORTE



Descripción:
Antibiótico. Antiinflamatorio.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Tilmicosina fosfato.....30 g
Meloxicam.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de neumonía, queratoconjuntivitis y pietín.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Neumonía: 1 ml cada 30 k.p.v.
Queratoconjuntivitis y pietín: 1 ml cada 30 a 60 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10, 50 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Tilmicosin (as phosphate).....30 g
Meloxicam.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of pneumonia, keratoconjunctivitis and foot rot.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Pneumonia: 1 ml every 30 k.l.w.
Keratoconjunctivitis and foot rot: 1 ml every 30 to 60 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10, 50 or 100 ml.

Trifect
FORTE



Descripción: Antibiótico. Antiinflamatorio. Analgésico. Antipirético.
Fórmula: Cada frasco con 18 g de polvo contiene:
Penicilina G sódica.....4.000.000 UI
Penicilina G procaínica.....3.000.000 UI
Penicilina G benzatínica.....3.000.000 UI
Sulfato de kanamicina.....5 g
Dipirona sódica.....5 g
Citrato de sodio anhidro.....0,08 g
Cada frasco con 40 ml de solvente contiene:
Alfaquimotripsina.....0,2 g
Tripsina.....0,03 g
Dimetilsulfóxido (D.M.S.O.).....0,4 g
Dexametasona 21 fosfato.....0,01 g
Clorhidrato de lidocaína.....0,1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de adenitis equina, leptospirosis, infecciones respiratorias, enteritis, nefritis, tétanos, artritis, inflamaciones de pene, infecciones secundarias a virosis, infecciones en heridas, flemones, cistitis, pielonefritis, y osteomielitis.
Especies a las que se destina: Equinos deportivos.
Administración: Vía intramuscular.
Dosificación: 8 ml de producto reconstituido cada 100 k.p.v.
Presentación: Caja con 1 frasco de 40 ml de solvente y 1 frasco de 18 g de polvo.

Description:
Antibiotic. Anti-inflammatory. Analgesic. Antipyretic.
Formula:
Each vial with 18 g of powder contains:
Penicillin G sodium.....4,000,000 I.U.
Penicillin G procaine.....3,000,000 I.U.
Penicillin G benzathine.....3,000,000 I.U.
Kanamycin sulfate.....5 g
Sodium dipyrone.....5 g
Anhydrous sodium citrate.....0.08 g
Each vial with 40 ml of solvent contains:
Alpha-chymotrypsin.....0.2 g
Trypsin.....0.03 g
Dimethyl sulfoxide (D.M.S.O.).....0.4 g
Dexamethasone 21 phosphate.....0.01 g
Lidocaine hydrochloride.....0.1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment of equine adenitis, leptospirosis, respiratory infections, enteritis, nephritis, tetanus, arthritis, penis inflammations, infections secondary to viral infections, wound infections, phlegmon, cystitis, pyelonephritis and osteomyelitis.
Animal species to which it is intended: Sport horses.
Administration: By intramuscular route.
Dosage: 8 ml of reconstituted product every 100 k.l.w.
Presentation: Box containing 1 vial with powder and 1 vial with solvent.

OVERXICAM

ANTIINFLAMATORIO
NO ESTEROIDE
DE ACCIÓN PROLONGADA





72 hs DE ACCIÓN
CON UNA SOLA APLICACIÓN

Su mejor aliado en los protocolos
de tratamiento de mastitis

OVERXICAM. Long acting, non steroid anti-inflammatory.
72 hours of action with only one dose.
Your best ally in the treatment of mastitis.

over®
www.over.com.ar

ANTIINFLAMATORIOS
ANTI-INFLAMMATORIES

02

Inyectables / Injectable
Dexametasona L.A. OVER
Dexametasona OVER
Enzivet
Flumeg
Overxicam
Synedem

Oral / Oral
Overxicam GEL EQUINOS

Locales / Local
GEL PARA EQUINOS Masagel

Dexametasona
L.A. OVER



Descripción: Corticosteroide. Antialérgico. Antiflogístico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Acetato de dexametasona.....0,8 g
Fosfato de dexametasona.....0,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de artritis, tendinitis, bursitis, sinovitis, dermatitis, urticarias, eczemas, inflamación de las vías respiratorias, reacciones alérgicas localizadas o generalizadas, tumores del tejido linfoide, edema de ubre (asociado a diuréticos), paresias por compresión, neuritis, y polineuritis.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular, subcutánea, intraarticular o infiltración local.
Dosificación:
Bovinos, ovinos y equinos: 2,5 a 5 ml.
Porcinos: 1 a 1,5 ml cada 100 k.p.v.
Caninos y felinos: 0,25 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Caja con 12 frascos de 10 ml de contenido neto cada uno. Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description:
Corticosteroid. Antiallergic. Antiphlogistic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Dexamethasone acetate.....0.8 g
Dexamethasone phosphate.....0.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of arthritis, tendinitis, bursitis, synovitis, dermatitis, urticaria, eczemas, respiratory tract inflammation, localized or generalized allergic reactions, lymphoid tissue tumors, udder edema (associated with diuretics), compression paresis, neuritis and polyneuritis.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, horses, swine, dogs and cats.
Administration:
By intramuscular, subcutaneous or intra-articular route or local infiltration.
Dosage:
Cattle, sheep and horses: 2.5 to 5 ml.
Swine: 1 to 1.5 ml every 100 k.l.w.
Dogs and cats: 0.25 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Box containing 12 vials with 10 ml each. Vial containing 50 ml.

Antiinflamatorios. Inyectables | Antiinflammatories. Injectable

Dexametasona
OVER



Descripción: Corticosteroide. Antialérgico. Antiflogístico.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Dexametasona 21 fosfato.....200 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de cetosis bovina, cetosis ovina, shock anafiláctico, traumático, infeccioso (asociado al tratamiento específico), manifestaciones alérgicas o inflamatorias localizadas o generalizadas, neuritis, polineuritis, tendinitis, mialgias, bursitis, paresias, urticarias y eczemas. Prevención y tratamiento del "Stress del transporte". Coadyuvante en el tratamiento de la "vaca caída". Tratamiento de edema de ubre asociado con diuréticos. Inducción del parto en vacas y ovejas.
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración: Vía endovenosa, intramuscular, intrasinovial, intraarticular o infiltración local.
Dosificación: Bovinos: 2,5 a 10 ml. **Equinos:** 2,5 a 12,5 ml. **Ovinos:** 1,25 a 10 ml. **Porcinos:** 0,5 a 1 ml. **Caninos:** 0,125 a 0,5 ml. **Felinos:** 0,06 a 0,125 ml.
Presentación: Caja con 12 frascos de 10 ml de contenido neto cada uno. Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description: Corticosteroid. Antiallergic. Antiphlogistic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Dexamethasone 21 phosphate.....200 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment of bovine ketosis, ovine ketosis, (anaphylactic, traumatic and infectious) shocks (associated with the specific treatment), localized or generalized allergic or inflammatory manifestations, neuritis, polyneuritis, tendinitis, myalgias, bursitis, paresis, urticaria and eczemas. Prevention and treatment of "transport stress". Coadjuvant in the treatment of the "downer cow" syndrome. Treatment of the udder edema (associated with diuretics). Parturition induction in cows and sheep.
Animals species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine, dogs and cats.
Administration: By intravenous, intramuscular, intra-synovial or intra-articular route or local infiltration.
Dosage: Cattle: 2.5 to 10 ml. **Horses:** 2.5 to 12.5 ml. **Sheep:** 1.25 to 10 ml. **Swine:** 0.5 to 1 ml. **Dogs:** 0.125 to 0.5 ml. **Cats:** 0.06 to 0.125 ml.
Presentation: Box containing 12 vials with 10 ml each. Vial containing 50 ml.

Enzivet



Descripción: Antiinflamatorio. Enzimático.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Alfaquimotripsina.....0,4 g
Tripsina.....0,1 g
Hialuronidasa.....0,1 g
Dimetilsulfóxido.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de inflamaciones y edemas combinado con el tratamiento específico. Impide la formación de bridas post quirúrgicas. Contribuye a la reabsorción de focos hemorrágicos. En procesos infecciosos generales actúa como coadyuvante de la acción de los antibióticos (neumonías, bronquitis, artritis, mastitis, abscesos, etc.). Tratamiento de edemas post traumáticos y de procesos necróticos y sépticos.
Especies a las que se destina: Equinos deportivos, caninos y felinos.
Administración: Vía intramuscular. Se puede utilizar en la dilución de antibióticos.
Dosificación: Equinos adultos: 10-25 ml. **Caninos y felinos:** 1–3 ml. **Potrillos:** 5–10 ml.
Presentación: Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description: Anti-inflammatory. Enzymatic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Alpha-chymotrypsin.....0.4 g
Trypsin.....0.1 g
Hyaluronidase.....0.1 g
Dimethyl sulfoxide.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of inflammations and edemas combined with the specific treatment. It prevents the formation of post-surgical adhesions. It contributes to the reabsorption of hemorrhagic foci. In general infectious processes, it acts as a coadjuvant to the action of antibiotics (pneumonia, bronchitis, arthritis, mastitis, abscesses, etc.). Treatment of post-traumatic edemas. Treatment of necrotic and septic processes.
Animal species to which it is intended: Sport horses, dogs and cats.
Administration: By intramuscular route. It can be used to dilute antibiotics.
Dosage: Adult horses: 10 to 25 ml. **Dogs and cats:** 1 to 3 ml. **Colts:** 5 to 10 ml.
Presentation: Vial containing 50 ml.

Antiinflamatorios. Inyectables | Antiinflammatories. Injectable

Flumeg



Descripción: Antiinflamatorio. Analgésico. No esteroide.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Flunixin meglumina.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Equinos: Alivio de lesiones inflamatorias del aparato locomotor (miositis, osteítis, artritis, tendinitis, sinovitis, etc.), y del dolor visceral asociado con la presentación de cólicos. **Bovinos:** Infecciones agudas del aparato respiratorio, diarrea, paresias, vacas caídas, etc. **Caninos:** Lesiones inflamatorias del aparato locomotor (miositis, osteítis, artritis, tendinitis, sinovitis, etc.), cuadros de dolor agudo incluyendo el shock endotóxico producido por procesos infecciosos virales o bacterianos. Coadyuvante en el tratamiento de parvovirosis canina.
Especies a las que se destina: Equinos, bovinos y caninos.
Administración: Vía intramuscular o endovenosa.
Dosificación: Equinos: 0,22 ml cada 10 k.p.v. **Bovinos:** 0,44 ml cada 10 k.p.v. **Caninos:** 0,22 a 0,4 ml cada 10 k.p.v. por día.
Presentación: Frascos con 10, 25 y 100 ml de contenido neto.

Description: Non steroid anti-inflammatory and analgesic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Flunixin meglumine.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Horses: Relief of inflammatory lesions of the locomotor system (myositis, osteitis, arthritis, tendinitis, synovitis, etc.) and relief of visceral pain associated with colics. **Cattle:** Acute respiratory infections, diarrhea, paresis, downer cow syndrome, etc. **Dogs:** Inflammatory lesions of the locomotor system (myositis, osteitis, arthritis, tendinitis, synovitis, etc.), acute pain situations including the endotoxic shock produced by viral or bacterial infectious processes. Coadjuvant in the treatment of canine parvovirosis.
Animal species to which it is intended: Horses, cattle and dogs.
Administration: By intramuscular or intravenous route.
Dosage: Horses: 0.22 ml every 10 k.l.w. **Cattle:** 0.44 ml every 10 k.l.w. **Dogs:** 0.22 ml to 0.40 ml every 10 k.l.w. per day.
Presentation:
Vials containing 10, 25 or 100 ml.

Overxicam



Descripción:
Antiinflamatorio no esteroide.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Meloxicam.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Tratamiento de infecciones respiratorias agudas, diarreas, mastitis, edema de ubre e inflamaciones podales. **Porcinos:** Trastornos no infecciosos del aparato locomotor, síntomas de cojeras e inflamación, septicemia, toxemia puerperal. **Equinos:** Trastornos musculoesqueléticos agudos y crónicos.
Especies a las que se destina:
Bovinos, porcinos y equinos.
Administración:
Bovinos: Vía subcutánea o endovenosa. **Porcinos:** Vía intramuscular. **Equinos:** Vía endovenosa.
Dosificación:
Bovinos: 2,5 ml cada 100 k.p.v. **Porcinos:** 2 ml cada 100 k.p.v. **Equinos:** 3 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10 y 50 ml de contenido neto.

Description:
Non-steroid anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Meloxicam.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Treatment of acute respiratory infections, diarrhea, mastitis, udder edema and foot inflammations. **Swine:** Non-infectious disorders of the locomotor system, lameness and inflammation symptoms, septicemia, puerperal toxemia. **Horses:** Acute and chronic musculoskeletal disorders.
Animal species to which it is intended:
Cattle, swine and horses.
Administration:
Cattle: By subcutaneous or intravenous route. **Swine:** By intramuscular route. **Horses:** By intravenous route.
Dosage:
Cattle: 2.5 ml every 100 k.l.w. **Swine:** 2 ml every 100 k.l.w. **Horses:** 3 ml every 100 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10 or 50 ml.

Antiinflamatorios. Inyectables | Antiinflammatories. Injectable

Synedem



Descripción:
Diurético. Antiinflamatorio. Antiedematoso.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fursemida.....5 g
Dexametasona 21 fosfato.....0,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Indicado en todas las especies para el tratamiento de edema pulmonar, congestión pulmonar, ascitis, edema renal, edema de gestación, edema cardíaco y edema hepático.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos y caninos.
Administración:
Vía endovenosa lenta o intramuscular.
Dosificación:
Bovinos, equinos y porcinos: 1 ml cada 50 k.p.v. **Caninos:** 0,25 a 0,5 ml cada 5 k.p.v. por día.
Presentación:
Caja con 12 frascos de 25 ml de contenido neto cada uno. Caja con 1 frasco de 50 ml de contenido neto.

Description:
Diuretic. Anti-inflammatory. Anti-edematous.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Fursemide.....5 g
Dexamethasone 21 phosphate.....0.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It is indicated in all species for the treatment of pulmonary edema, pulmonary congestion, ascites, renal edema, gestational edema, cardiac edema and hepatic edema.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine and dogs.
Administration:
Intramuscular or slow intravenous route.
Dosage:
Cattle, horses and swine: 1 ml every 50 k.l.w. **Dogs:** 0.25 to 0.5 ml every 5 k.l.w. per day.
Presentation:
Box containing 12 vials with 25 ml each. Box containing 1 vial with 50 ml.

Overxicam
GEL EQUINOS



Descripción:
Antiinflamatorio no esteroide.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Meloxicam.....4,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Alivio del dolor y la inflamación en trastornos locomotores y musculoesqueléticos agudos y crónicos, dolor asociado a cólicos, analgesia pre y post quirúrgica.
Especies a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
6 g cada 450 k.p.v.
Presentación:
Jeringa con 30 g de contenido neto.

Description:
Non-steroid anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Meloxicam.....4.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Relief of pain and inflammation in acute and chronic locomotor and musculoskeletal disorders, pain associated with colics, pre and post-surgical analgesia.
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
By oral route.
Dosage:
6 g every 450 k.l.w.
Presentation:
30 g-syringe.

GEL PARA EQUINOS OVER
Masagel



Descripción:
Antiinflamatorio esteroide. Rubefaciente.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Dexametasona 21 fosfato .....0,004 g
Prednisolona base.....0,004 g
Salicilato de metilo.....1 g
Alcanfor.....1,5 g
DMSO.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Mialgias, distensiones, luxaciones, artritis, dolores musculares y articulares en general.
Especies a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Uso externo. Se aplica en forma de masajes suaves.
Dosificación:
Conforme al caso clínico y al criterio del profesional actuante.
Presentación:
Pomo con 200 g de contenido neto.

Description:
Steroid anti-inflammatory. Rubefacient.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Dexamethasone 21 phosphate.....0.004 g
Prednisolone base.....0.004 g
Methyl salicylate.....1 g
Camphor.....1.5 g
DMSO.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Myalgias, distensions, dislocations, arthritis, general muscle and joint pains.
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
External use. It is applied with soft massages.
Dosage:
According to the clinical case and the vet's discretion.
Presentation:
Collapsible tube containing 200 g.

over®
MEDICINA VETERINARIA



NUEVO!

TRIMOX PLUS

ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO
MOXIDECTINA / OXFENDAZOL / PRAZIQUANTEL

NEW! Trimox Plus. Broad spectrum internal antiparasitic. Moxidectin. Oxfendazole. Praziquantel.

www.trimoxplus.com.ar **www.over.com.ar**

ANTIPARASITARIOS
ENDECTOCIDAS
ENDECTOCIDE
ANTIPARASITICS

03

Inyectables / Injectable
Dovertec
Overmax L.A. PREMIUM
Overmax PREMIUM
Overmectina DUPLEX
Overmectina F
Overmectina L.A. ZINC
Overmectina L.A. ZINC 1%
Overmectina MAGNUM 4%
Overmectina TRIPLEX
Vermectín
Vermectín L.A. PREMIUM

Orales / Oral
Overmectina TOTAL EQUINOS
Overmectina TRIPLE ORAL
Trimox PLUS
Vermectín B12 EQUINOS
Vermectín PREMIX PORCINOS

Pour On / Pour On
Eprinover POUR ON
Vermectín POUR ON

over®

Dovertec



Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Doramectina.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis por nematodos gastrointestinales y pulmonares, sarna bovina y miasis cutánea.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Doramectin.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of parasitosis caused by gastrointestinal and pulmonary nematodes, bovine mange and cutaneous myiasis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Antiparasitarios Endectocidas. Inyectables | Endectocide Antiparasitics. Injectable

Overmax L.A.
PREMIUM



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario interno y externo. Anabólico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....3,15 g
Zeranol.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de parasitosis internas y externas. Favorece el engorde.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Bovinos: Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Ovinos: Vía subcutánea en la cara interna de la pierna.
Dosificación:
Bovinos: 1 ml cada 50 k.p.v. **Ovinos:** 1 ml cada 30 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Internal and external antiparasitic. Anabolic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....3.15 g
Zeranol.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of internal and external parasitosis. It promotes the animal's fattening.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
Cattle: By subcutaneous route on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it.
Sheep: By subcutaneous route in the inner face of the leg.
Dosage:
Cattle: 1 ml every 50 k.l.w. **Sheep:** 1 ml every 30 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Overmax
PREMIUM



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Endectocida. Promotor del crecimiento y engorde.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....1 g
Zeranol.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de parasitosis internas y externas. Favorece el engorde.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Bovinos: Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Ovinos: Vía subcutánea en la cara interna de la pierna.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Endectocide. It promotes the animal's growth and fattening.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....1 g
Zeranol.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of internal and external parasitosis. It promotes the animal's fattening.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
Cattle: By subcutaneous route on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it. **Sheep:** By subcutaneous route in the inner face of the leg.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Antiparasitarios Endectocidas. Inyectables | Endectocide Antiparasitics. Injectable

Overmectina
DUPLEX



PRÓXIMO LANZAMIENTO

Descripción:
Antiparasitario interno y externo de amplio espectro.
Formula:
Cada 100 ml contiene:
Levamisol clorhidrato.....20 g
Ivermectina .....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones de uso:
Tratamiento y control de parasitosis externas e internas.
Especies animales a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Bovinos: Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta. No debe aplicarse por vía endovenosa o intramuscular.
Ovinos: Vía subcutánea en la cara interna de la pierna.
Dosificación:
1 ml de la solución lista para usar cada 25 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

TO BE LAUNCHED

Description:
Broad-spectrum internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Levamisole hydrochloride.....20 g
Ivermectin.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of internal and external parasitosis.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
Cattle: By subcutaneous route on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it. It should not be applied by intravenous or intramuscular route.
Sheep: By subcutaneous route in the inner face of the leg.
Dosage:
1 ml of the ready-to-use solution every 25 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Overmectina
F



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....1 g
Clorsulón .....10 g
Agentes de formulación.....c.s
Indicaciones:
Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, *Fasciola hepatica* y *Fasciola gigantica*, parásitos pulmonares, piojos chupadores, miasis cutánea y sarna común.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10, 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....1 g
Clorsulon.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal nematodes, *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica*, lung parasites, sucking lice, cutaneous myiasis and common mange.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10, 50, 200 or 500 ml.

Antiparasitarios Endectocidas. Inyectables
Endectocide Antiparasitics. Injectable

Overmectina
L.A. ZINC



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción: Antiparasitario interno y externo.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....1,25 g
Zinc edetato.....0,01 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Bovinos: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores, ura, miasis, ácaros de la sarna y garrapata bovina. **Ovinos:** Parásitos internos y externos (sarna ovina). **Porcinos:** Parásitos gastrointestinales, pulmonares y del riñón, piojos y ácaros. Aporta zinc como coadyuvante de enfermedades provocadas por su carencia.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración: Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Dosificación: Bovinos: 1 ml cada 50 k.p.v. **Ovinos:** Parásitos internos: 1 ml cada 50 k.p.v.; parásitos externos: 1 ml cada 30 k.p.v. **Porcinos:** 1 ml cada 33 k.p.v.
Presentación: Frasco con 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description: Internal and external antiparasitic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....1.25 g
Zinc edetate.....0.01 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Treatment and control of gastrointestinal and lung parasites, sucking lice, human botflies, myiasis, mange mites and bovine ticks. **Sheep:** Internal and external parasites (sheep mange). **Swine:** Gastrointestinal, lung and kidney parasites, lice and mites. It provides zinc as a coadjuvant for diseases caused by zinc deficiencies.
Animal species to which it is intended: Cattle, sheep and swine.
Administration: By subcutaneous route, on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it.
Dosage: Cattle: 1 ml every 50 k.l.w. **Sheep:** 1 ml every 50 k.l.w. for internal parasites; 1 ml every 30 k.l.w. for external parasites. **Swine:** 1 ml every 33 k.l.w.
Presentation: Vial containing 500 ml.

Overmectina
L.A. ZINC 1%



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción: Antiparasitario interno y externo.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....1 g
Zinc edetato.....0,01 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Bovinos: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores, ura, miasis, ácaros de la sarna y garrapata bovina. **Ovinos:** Parásitos internos y externos (sarna ovina). **Porcinos:** Parásitos gastrointestinales, pulmonares y del riñón, piojos y ácaros. Aporta zinc como coadyuvante de enfermedades provocadas por su carencia.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración: Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Dosificación: Bovinos: 1 ml cada 50 k.p.v. **Ovinos:** Parásitos internos: 1 ml cada 50 k.p.v.; parásitos externos: 1 ml cada 30 k.p.v. **Porcinos:** 1 ml cada 33 k.p.v.
Presentación: Frascos con 50, 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description: Internal and external antiparasitic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....1 g
Zinc edetate.....0.01 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Treatment and control of gastrointestinal and lung parasites, sucking lice, human botflies, myiasis, mange mites and bovine ticks. **Sheep:** Internal and external parasites (sheep mange). **Swine:** Gastrointestinal, lung and kidney parasites, lice and mites. It provides zinc as a coadjuvant for diseases caused by zinc deficiencies.
Animal species to which it is intended: Cattle, sheep and swine.
Administration: By subcutaneous route, on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it.
Dosage: Cattle: 1 ml every 50 k.l.w. **Sheep:** 1 ml every 50 k.l.w. for internal parasites; 1 ml every 30 k.l.w. for external parasites. **Swine:** 1 ml every 33 k.l.w.
Presentation: Vials containing 50, 100, 250 or 500 ml.

Antiparasitarios Endectocidas. Inyectables | Endectocide Antiparasitics. Injectable

Overmectina
MAGNUM 4%



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores, ácaros de la sarna, y miasis cutánea.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal and lung parasites, sucking lice, mange mites, and cutaneous myiasis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route, on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Overmectina
TRIPLEX



PRÓXIMO LANZAMIENTO

Descripción:
Antiparasitario interno y externo de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Levamisol clorhidrato.....20 g
Clorsulón.....5 g
Ivermectina.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.p.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis externas e internas.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Bovinos: Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta. No debe aplicarse por vía endovenosa o intramuscular.
Ovinos: Vía subcutánea en la cara interna de la pierna.
Dosificación:
1 ml de la solución lista para usar cada 25 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

TO BE LAUNCHED

Description: Broad-spectrum internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Levamisole hydrochloride.....20 g
Clorsulon.....5 g
Ivermectin.....0.5 g
Formulation agents..... q.s.
Indications:
Treatment and control of internal and external parasitosis.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
Cattle: By subcutaneous route on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it. It should not be applied by intravenous or intramuscular route.
Sheep: By subcutaneous route in the inner face of the leg.
Dosage:
1 ml of the ready-to-use solution every 25 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Antiparasitarios Endectocidas. Inyectables | Endectocide Antiparasitics. Injectable

Vermectín



Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, piojos chupadores, miasis cutánea, y sarna común del bovino.
Porcinos: Tratamiento y control de lombrices gastrointestinales, pulmonares y del riñón, piojos y ácaros.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Bovinos: 1 ml cada 50 k.p.v. **Porcinos:** 1 ml cada 33 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10, 25, 50, 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Treatment and control of gastrointestinal and lung nematodes, sucking lice, cutaneous myiasis and common bovine mange. **Swine:** Treatment and control of gastrointestinal, lung and kidney worms, lice and mites.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Cattle: 1 ml every 50 k.l.w. **Swine:** 1 ml every 33 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10, 25, 50, 100, 250 or 500 ml.

Vermectín
L.A. PREMIUM



Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....3,15 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Bovinos: Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, ácaros de la sarna y garrapatas. **Ovinos:** Tratamiento y control de parásitos internos, ácaros de la sarna y melófago.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v. **Sarna ovina y melófago:** 1 ml cada 30 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10, 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....3.15 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cattle: Treatment and control of gastrointestinal parasites, mange mites and ticks. **Sheep:** Treatment and control of internal parasites, mange mites and *Melophagus ovinus.*
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w. **Sheep mange and *Melophagus ovinus:*** 1 ml every 30 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10, 50, 200 or 500 ml.

Overmectina
TOTAL EQUINOS



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Ivermectina.....1,2 g
Praziquantel.....15 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de parasitosis gastrointestinales y control de lesiones cutáneas causadas por larvas de *Habronema spp.*, *Draschia spp.*, y microfilarias cutáneas de *Onchocerca spp.*
Especies a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 g cada 60 k.p.v.
Presentación:
Jeringa con 10 g de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Ivermectin.....1.2 g
Praziquantel.....15 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of gastrointestinal parasitosis and control of skin lesions caused by larvae of *Habronema spp.* and *Draschia spp.*, and by cutaneous microfilariae of *Onchocerca spp.*
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 g every 60 k.l.w.
Presentation:
10 g-syringe.

Overmectina
TRIPLE ORAL



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Levamisol clorhidrato.....8 g
Triclabendazol.....12 g
Ivermectina.....0,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de parasitosis producidas por vermes gastrointestinales y pulmonares. Control de infestaciones de *Fasciola hepatica* y *Fasciola gigantica* adultas e inmaduras.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidón mochila con 2,5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Levamisole hydrochloride.....8 g
Triclabendazole.....12 g
Ivermectin.....0.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of parasitosis caused by gastrointestinal and lung worms. Control of infestations caused by adult and immature stages of *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica.*
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Jerry can (backpack type) containing 2.5 liters.

Antiparasitarios Endectocidas. Orales
Endectocide Antiparasitics. Oral

Trimox
PLUS



Descripción:
Antiparasitario interno de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Moxidectina.....0,8 g
Oxfendazol.....20 g
Praziquantel.....5 g
Agentes de formulación..... c.s
Indicaciones clínicas de uso:
Tratamiento y control de las parasitosis producidas por pequeños estrónglos, grandes estrónglos y cestodos.
Especies animales a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 g cada 20 k.p.v o 25 g cada 500 k.p.v.
Presentación:
Jeringa con 30 g de contenido neto.

Description:
Broad spectrum internal antiparasitic.
Formula:
Each 100 g, it contains:
Moxidectin.....0.8 g
Oxfendazole.....20 g
Praziquantel.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Clinical indications of use:
Treatment and control of parasitosis produced by small strongyles, large strongyles and cestodes.
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 g every 20 k.l.w. or 25 g every 500 k.l.w.
Presentation:
30 g-syringe.

Vermectín
B12 EQUINOS



Descripción:
Antiparasitario interno de amplio espectro.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Ivermectina.....1 g
Vitamina B12 .....0,05 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos internos. Efectivo contra estadíos larvales y adultos de grandes y pequeños estróngilos.
Especies a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
2 g cada 100 k.p.v.
Presentación:
Jeringa con 10 g de contenido neto.

Description:
Broad spectrum internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Ivermectin.....1 g
Vitamin B12.....0.05 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of internal parasites. It is effective against larval and adult stages of large and small strongyles.
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
By oral route.
Dosage:
2 g every 100 k.l.w.
Presentation:
10 g-syringe.

Vermectín
PREMIX PORCINOS



Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Ivermectina.....0,6 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de lombrices gastrointestinales, pulmonares y del riñón, piojos y ácaros.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento.
Dosificación:
300 g por tonelada de ración.
Presentación:
Bolsa con 1 kg de contenido neto. Balde con 5 kg de contenido neto.

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Ivermectin.....0.6 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal, lung and kidney worms, lice and mites.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Administration:
By oral route, mixed with the food.
Dosage:
300 g per ton of food ration.
Presentation:
Bag containing 1 kg. Bucket containing 5 kg.

Eprinover
POUR ON



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Eprinomectina.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, piojos chupadores y masticadores, miasis cutánea, sarna del vacuno y mosca de los cuernos.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidones autodosificables con 100 ml y 1 litro de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Eprinomectin.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal and pulmonary nematodes, sucking and chewing lice, cutaneous myiasis, bovine mange and horn fly.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Self-dosing jerry cans containing 100 ml or 1 liter.

Antiparasitarios Endectocidas. Pour on
Endectocide Antiparasitics. Pour on

Vermectín
POUR ON



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, ura, piojos chupadores y masticadores, ácaros y moscas.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidones autodosificables con 100 ml y 1 litro de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal and lung parasites, *Dermatobia hominis*, sucking and chewing lice, mites and flies.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Self-dosing jerry cans containing 100 ml or 1 liter.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS
EXTERNAL ANTIPARASITICS

04

Caravanas / Ear Tags
Caravanas INSECTICIDAS SYNECT DC
Caravanas OVER DIAZINÓN 40%

Inmersión - Aspersión / Spraying - Immersion
Garrathion MAX OVER
Mos-k-tión A.I.
Overtraz
Synect ASPERSIÓN

Locales / Local
Synect PLATA LÍQUIDO

Pour On / Pour On
Mos-k-tión F
Mos-k-tión P.F.
Overline LARGE
Overline LARGE DUO
Overtak
Overtak FULL
Super Synect POUR ON
Synect POUR ON
Synect PREMIUM

Polvos / Powder
Synect CURABICHERAS POLVO

Aerosoles / Aerosol
Synect PLATA

over®

Caravanas
INSECTICIDAS SYNECT DC



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 g de caravana contiene:
Diazinón.....30 g
Etil clorpirifos.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de infestaciones por la mosca de los cuernos *(Haematobia irritans).*
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Aplicación:
Una caravana por animal en el surco auricular.
Presentación:
Caja con 5 bolsas conteniendo 20 caravanas cada una.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 g of ear tag, it contains:
Diazinon.....30 g
Chlorpyrifos ethyl.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of infestations caused by *Haematobia irritans* (horn fly).
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Application:
Put one ear tag per animal, in the auricular groove.
Presentation:
Box containing 5 bags with 20 ear tags each.

Antiparasitarios Externos. Caravanas | External Antiparasitics. Ear Tags

Caravanas
OVER DIAZINÓN 40%



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 g de caravana contiene:
Diazinón.....40 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de infestaciones por la mosca de los cuernos *(Haematobia irritans).*
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Aplicación:
Una caravana por animal en el surco auricular.
Presentación:
Caja con 5 bolsas conteniendo 20 caravanas cada una.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 g of ear tag, it contains:
Diazinon.....40 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of infestations caused by *Haematobia irritans* (horn fly).
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Application:
Put one ear tag per animal in the auricular groove.
Presentation:
Box containing 5 bags with 20 ear tags each.

Garrathion
MAX OVER



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....10 g
Etión.....40 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de la garrapata común del bovino *(Rhipicephalus microplus).*
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Uso externo. Baños de inmersión.
Dosificación:
Pie de baño: 1 litro cada 1000 litros de agua. **Refuerzo y reposición:** 1 ½ litros cada 1000 litros de agua que se agreguen. **Refuerzo en seco:** ½ litro cada vez que el nivel de baño baje 1000 litros.
Presentación:
Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....10 g
Ethion.....40 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of the common bovine tick *(Rhipicephalus microplus).*
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
External use. Immersion baths.
Dosage:
Foot bath: 1 liter every 1,000 liters of water. **Reinforcement and replenishment:** 1 ½ liters every 1,000 liters of water to be added. **Dry reinforcement:** ½ liter each time the bath level drops by 1,000 liters.
Presentation:
Jerry can containing 5 liters.

Antiparasitarios Externos. Inmersión / Aspersión
External Antiparasitics. Spraying / Immersion

Mos-k-tión
A.I.



Descripción:
Antiparasitario externo. Insecticida. Piojicida. Repelente de insectos.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....6,75 g
Etión.....27 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de piojos chupadores. Repele moscas, mosquitos, jejenes, tábanos, etc.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Por aspersión.
Dosificación:
1,5 litros cada 1000 litros de agua.
Presentación:
Frascos con 500 ml y 1 litro de contenido neto.

Description:
External antiparasitic. Insecticide. Lice killer. Insect repellent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....6.75 g
Ethion.....27 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of suckling lice. It repels flies, mosquitoes, gnats, horseflies, etc.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By spraying.
Dosage:
1.5 liters dissolved in 1,000 liters of water.
Presentation:
Vials containing 500 ml or 1 liter.

Overtraz



Descripción:
Antiparasitario externo. Garrapaticida. Antisárnico. Piojicida.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Amitraz.....12,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de piojos, sarna y garrapatas.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Por inmersión.
Dosificación:
Preparación del baño: 4 litros cada 2000 litros de agua y 20 kg de estabilizante.
Refuerzo y reposición: 4 litros cada 1000 litros de agua y 20 kg de estabilizante.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto más bolsa con 5 kg de estabilizante. Bidón con 4 litros de contenido neto más 4 bolsas con 5 kg de estabilizante.

Description:
External antiparasitic. Tick killer. Anti-mange agent. Lice killer.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Amitraz.....12.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment against lice, mange and ticks.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By immersion.
Dosage:
Bath: 4 liters every 2,000 liters of water and 20 kg of stabilizer. **Reinforcement and replenishment:** 4 liters every 1,000 liters of water and 20 kg of stabilizer.
Presentation:
Bottle containing 1 liter plus a bag containing 5 kg of a stabilizer. Jerry can containing 4 liters plus 4 bags containing each 5 kg of a stabilizer.

Antiparasitarios Externos. Inmersión / Aspersión
External Antiparasitics. Spraying / Immersion

Synect
ASPERSIÓN



Descripción:
Antiparasitario externo. Insecticida. Piojicida. Repelente de insectos.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de insectos y ácaros en instalaciones rurales e industriales, tambos, salas de ordeñe, caballerizas, parideras, galpones, habitaciones, etc. Aplicable también directamente sobre los animales. Indicado para repeler insectos en espacios abiertos.
Administración:
Por aspersión.
Dosificación:
20 a 40 ml cada 10 litros de agua.
Presentación:
Frascos con 100 y 500 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic. Insecticide. Lice killer. Insect repellent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of insects and mites in rural and industrial facilities, dairy farms, milking rooms, studs, farrowing barns, sheds, rooms, etc. It may be also applied directly on the animals. It is indicated to repel insects in open spaces.
Administration:
By spraying.
Dosage:
20 to 40 ml diluted in 10 liters of water.
Presentation:
Vials containing 100 or 500 ml.

Synect
PLATA LÍQUIDO



Descripción:
Antiparasitario externo. Curabicheras.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Spinosad..... 1 g
Sulfadiazina de plata.....0,1 g
Agentes de formulación.....c.s.p.
Indicaciones:
Para prevención y tratamiento de miasis cutánea (bicheras), provocadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax.* La sulfadiazina de plata tiene acción bacteriostática y a concentraciones mayores, bactericida sobre *Streptococcus spp. y Staphylococcus spp.*
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Pulverizar hasta cubrir la zona afectada.
Presentación:
Botella con 250 ml de contenido neto con aplicador.

Description:
External antiparasitic. Anti-screwworm agent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Spinosad..... 1 g
Silver sulfadiazine .....0.1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It is indicated for the prevention and treatment of cutaneous myiasis (screwworms) caused by larvae of *Cochliomyia hominivorax*. Silver sulfadiazine offers a bacteriostatic action and, at higher concentrations, it offers a bactericidal action on *Streptococcus spp.* and *Staphylococcus spp.*
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, goats and swine.
Administration:
External use.
Dosage:
Spray the product until the affected area is covered.
Presentation:
Bottle containing 250 ml, provided with an applicator.

Mos-k-tión
F



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Etión.....15 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control y tratamiento de infestaciones por la mosca de los cuernos *(Haematobia irritans)*, moscas sensibles y resistentes a piretroides.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
Bovinos de 100 a 200 k.p.v.: 5 ml.
Bovinos de 200 a 400 k.p.v.: 10 ml.
Bovinos de más de 400 k.p.v.: 20 ml (dosis máxima).
Presentación:
Bidón autodosificable con 1 litro de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ethion.....15 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control and treatment of infestations caused by horn flies *(Haematobia irritans).* To be used against flies sensitive and resistant to pyrethroids.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
Cattle weighing from 100 k.l.w. to 200 k.l.w.: 5 ml. **Cattle weighing from 200 k.l.w. to 400 k.l.w.:** 10 ml. **Cattle weighing more than 400 k.l.w.:** 20 ml (maximum dose).
Presentation:
Self-dosing jerry can containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Mos-k-tión
P.F.



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....5 g
Etión.....15 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control y tratamiento de infestaciones por la mosca de los cuernos *(Haematobia irritans)*, para moscas sensibles y resistentes a piretroides.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
Bovinos de 100 a 200 k.p.v.: 5 ml.
Bovinos de 200 a 400 k.p.v.: 10 ml.
Bovinos de más de 400 k.p.v.: 20 ml (dosis máxima).
Presentación:
Bidón autodosificable con 1 litro de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....5 g
Ethion.....15 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control and treatment of infestations produced by horn flies *(Haematobia irritans).* To be used against flies sensitive and resistant to pyrethroids.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
Cattle weighing from 100 k.l.w. to 200 k.l.w.: 5 ml. **Cattle weighing from 200 k.l.w. to 400 k.l.w.:** 10 ml. **Cattle weighing more than 400 k.l.w.:** 20 ml (maximum dose).
Presentation:
Self-dosing jerry can containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Antiparasitarios Externos. Pour on | External Antiparasitics. Pour on

Overline
LARGE



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de la mosca de los cuernos *(Haematobia irritans)*, garrapatas *(Rhipicephalus microplus)*, ura o tórsalo *(Dermatobia hominis)*, piojos chupadores, masticadores y bicheras.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidón mochila con 1 y 5 litros de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Fipronil.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of horn flies *(Haematobia irritans)*, ticks *(Rhipicephalus microplus)*, human botflies *(Dermatobia hominis)*, sucking and chewing lice, and screwworms.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Jerry cans containing 1 or 5 liters.

Overline
LARGE DUO



Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil.....1 g
Ivermectina.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, mosca de los cuernos *(Haematobia irritans)*, garrapatas *(Rhipicephalus microplus)*, ura o tórsalo *(Dermatobia hominis)*, piojos chupadores, masticadores y bicheras.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidones con 1 y 5 litros de contenido neto.

Description:
External and internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Fipronil.....1 g
Ivermectin .....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of horn flies *(Haematobia irritans)*, ticks *(Rhipicephalus microplus)*, human botflies *(Dermatobia hominis)*, sucking and chewing lice, and screwworms.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Jerry cans containing 1 or 5 liters.

Antiparasitarios Externos. Pour on | External Antiparasitics. Pour on

Overtak



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Antiparasitario externo. Garrapaticida.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fluazurón.....2,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de la garrapata común del bovino *(Rhipicephalus microplus)*.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
5 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Bidón autodosificable con 1 litro de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
External antiparasitic. Tick killer.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Fluazuron.....2.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment against common bovine ticks *(Rhipicephalus microplus)*.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
5 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Self-dosing jerry can containing 1 liter.

Overtak
FULL



Descripción:
Antiparasitario interno y externo.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Fluazurón.....2,5 g
Ivermectina.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos *(Rhipicephalus microplus)*. Inhibidor del desarrollo de la garrapata común del bovino.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidón mochila con 5 litros de contenido neto.

Description:
Internal and external antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Fluazuron.....2.5 g
Ivermectin.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal and pulmonary parasites, and ectoparasites *(Rhipicephalus microplus)*. It inhibits the development of the common bovine tick.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Jerry can (backpack type) containing 5 liters.

Antiparasitarios Externos. Pour on | External Antiparasitics. Pour on

Super Synect
POUR ON



Descripción:
Antiparasitario externo. Piojicida. Repelente de insectos.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....5 g
Carbaril.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de piojos masticadores y chupadores, moscas, mosquitos, jejenes, tábanos, ectoparásitos sensibles y resistentes a piretroides.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos y ovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
Piojicida: Bovinos y equinos: 10 a 20 ml. Ovinos: 5 ml. Porcinos: 5 ml. **Control de la mosca de los cuernos:** Bovinos de hasta 400 k.p.v.: 10 ml. Bovinos de más de 400 k.p.v.: 20 ml. **Repelente de insectos:** Bovinos y equinos: 30 ml. Ovinos: 5 ml. Porcinos: 5 ml.
Presentación:
Bidón autodosificable con 1 litro de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
External antiparasitic. Lice killer. Insect repellent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....5 g
Carbaryl.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of chewing and sucking lice, flies, mosquitoes, gnats, horseflies and ectoparasites which are sensitive and resistant to pyrethroids.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine and sheep.
Administration:
Pour on.
Dosage:
Lice killer: 10 to 20 ml for cattle and horses; 5 ml for sheep; 5 ml for swine. **Horn fly control:** 10 ml for cattle weighing up to 400 k.l.w.; 20 ml for cattle weighing more than 400 k.l.w. **Insect repellent:** 30 ml for cattle and horses; 5 ml for sheep; 5 ml for swine.
Presentation:
Self-dosing jerry can containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Synect
POUR ON



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de la mosca de los cuernos *(Haematobia irritans).*
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Pour on.
Dosificación:
Animales de hasta 400 kg: 10 ml.
Animales de más de 400 kg: 20 ml.
Presentación:
Bidón autodosificable con 1 litro de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of horn flies *(Haematobia irritans).*
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
Pour on.
Dosage:
10 ml for animals weighing up to 400 kg; 20 ml for animals of more than 400 kg.
Presentation:
Self-dosing jerry can containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Antiparasitarios Externos. Pour on
External Antiparasitics. Pour on

Synect
PREMIUM



Descripción:
Antiparasitario externo. Mosquicida. Piojicida. Repelente de insectos.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....5 g
Carbaril.....2 g
Butóxido de piperonilo.....7 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de piojos masticadores y chupadores, moscas, mosquitos, jejenes, tábanos, ectoparásitos sensibles y resistentes a piretroides.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.
Administración: Pour on.
Dosificación:
Piojicida: Bovinos y equinos: 10 ml cada 100 k.p.v.. Ovinos: 5 ml. Porcinos: 1 ml cada 10 k.p.v. **Control de la mosca de los cuernos:** Bovinos de hasta 400 k.p.v.: 10 ml. Bovinos de más de 400 k.p.v.: 20 ml. **Repelente de insectos:** Bovinos y equinos: 30 ml. Ovinos: 5 ml en cada escápula. Porcinos: 5 ml.
Presentación:
Bidón autodosificable con 1 litro de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
External antiparasitic. Fly killer. Lice killer. Insect repellent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....5 g
Carbaryl.....2 g
Piperonyl butoxide.....7 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of chewing and sucking lice, flies, mosquitoes, gnats, horseflies and ectoparasites which are sensitive and resistant to pyrethroids.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep and swine.
Administration: Pour on.
Dosage: Lice killer: 10 ml every 100 k.l.w. for cattle and horses; 5 ml for sheep; 1 ml every 10 k.l.w. for swine. **Horn fly control** *(Haematobia Irritans):* 10 ml for cattle weighing up to 400 k.l.w.; 20 ml for cattle weighing more than 400 k.l.w. **Insect repellent:** 30 ml for cattle and horses; 5 ml for sheep on each shoulder blade; 5 ml for swine.
Presentation:
Self-dosing jerry can containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Synect
CURABICHERAS POLVO



Descripción:
Antiparasitario externo. Curabicheras. Cicatrizante con bacteriostático.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Cipermetrina.....1 g
Carbaril.....2 g
Sulfametazina sódica.....1 g
Óxido de zinc.....10 g
Esencia de pino.....0,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de miasis cutánea (bicheras) producidas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*, y de infecciones secundarias provocadas por gérmenes sensibles a la sulfametazina.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.
Administración:
Uso externo local. Administrar como polvo mediante la talquera, como pasta (mezclado con agua) o ungüento (mezclado con aceite o vaselina).
Presentación:
Talqueras con 100 y 400 g de contenido neto.

Description:
External antiparasitic. Anti-screwworm agent. Healer with a bacteriostatic agent.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Cypermethrin.....1 g
Carbaryl.....2 g
Sulfamethazine sodium.....1 g
Zinc oxide.....10 g
Pine essence.....0.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of cutaneous myiasis (screwworms) produced by larvae of *Cochliomyia hominivorax.* Treatment and prevention of secondary infections caused by sulfamethazine-sensitive germs.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine, sheep and goats.
Administration:
Local external use. It can be administered as a powder with the use of a powder container; as a paste mixed with water, or as an ointment mixed with oil or vaseline.
Presentation:
Powder container with 100 or 400 g of powder.

Synect
PLATA



Descripción:
Antiparasitario externo. Curabicheras. Cicatrizante.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Sulfadiazina de plata.....0,1 g
Aluminio micronizado.....5 g
DDVP (Diclorvos).....1,6 g
Cipermetrina.....0,2 g
Aceite de pino.....4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de bicheras. Bactericida, hemostático y astringente. Ayuda a la cicatrización de heridas. Actúa como larvicida en heridas con miasis acelerando la cicatrización. Forma una película protectora que permite identificar a los animales tratados.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos y caninos.
Administración:
Uso local externo.
Dosificación:
Pulverizar desde una distancia aproximada de 25 cm hasta cubrir la zona afectada.
Presentación:
Aerosol con 270 g (418 ml) de contenido neto.

Description:
External antiparasitic. Anti-screwworm agent. Healing agent.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Silver sulfadiazine.....0.1 g
Micronized aluminium.....5 g
DDVP (Dichlorvos).....1.6 g
Cypermethrin.....0.2 g
Pine oil.....4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of screwworms. Bactericide, hemostatic, astringent. It helps to heal wounds. It acts like a larvicide in wounds with myiasis, accelerating the healing action. It forms a protective film that allows the treated animals to be identified.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine and dogs.
Administration:
Local external use.
Doses:
Spray the product from a distance of approximately 25 cm until the affected area is covered.
Presentation:
Aerosol spray can containing 270 g (418 ml).

ANTIPARASITARIOS INTERNOS
INTERNAL ANTIPARASITICS

05

Inyectables / Injectable
Overmisol 200
Overxinil
Ricomax
Ricomax N.F.

Orales / Oral
Albendazol OVER (Overzol) 3,8 Co
Albendazol OVER (Overzol) 10 Co
Eleval OVINOS
Overcox 2,5%
Overcox 5%
Overfen 10%
Overfen PREMIX PORCINOS
Triclabendazol 5% OVER
Triclabendazol 10% OVER
Vermox 5 Co ORAL
Vermox 10 Co I.R.

Overmisol
200



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Levamisol clorhidrato.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de las parasitosis producidas por vermes gastrointestinales y pulmonares.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos y porcinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
1 ml cada 25 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Levamisole hydrochloride.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of parasitosis caused by gastrointestinal and lung worms.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep and swine.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
1 ml every 25 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Antiparasitarios Internos. Inyectables | Internal Antiparasitics. Injectable

Overxinil



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Nitroxinil.....34 g
Acetilmetionina.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infestaciones provocadas por trematodes. Aumenta la capacidad defensiva natural del hígado.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
1,5 ml cada 50 k.p.v. **Infestaciones agudas:** 2 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Nitroxynil.....34 g
Acetylmethionine.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of infestations caused by trematodes. It increases the natural defensive capacity of the liver.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
1.5 ml every 50 k.l.w. **Acute infestations:** 2 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Ricomax



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ricobendazol.....15 g
Hipofosfito de calcio.....0,5 g
Cloruro de cobre.....0,2 g
Sulfato de zinc.....0,04 g
Clorhidrato de lidocaína.....0,4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos internos en sus formas adultas, inmaduras y huevos. Previene y corrige la carencia de minerales.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea en la piel floja por delante o por detrás de la paleta.
Dosificación:
1 ml cada 40 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ricobendazole.....15 g
Calcium hypophosphite.....0.5 g
Copper chloride.....0.2 g
Zinc sulfate.....0.04 g
Lidocaine hydrochloride.....0.4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of internal parasites in their adult, immature and egg stages. It prevents and corrects mineral deficiencies.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route, on the loose skin in front of the shoulder blade or behind it.
Dosage:
1 ml every 40 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Antiparasitarios Internos. Inyectables | Internal Antiparasitics. Injectable

Ricomax
N.F.



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ricobendazol.....15 g
Clorhidrato de lidocaína.....0,4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parásitos internos.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 40 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ricobendazole.....15 g
Lidocaine hydrochloride.....0.4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of internal parasites.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 40 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Albendazol

OVER (Overzol) 3,8 Co



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Albendazol.....3,8 g
Sulfato de cobalto.....0,46 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis producidas por parásitos gastrointestinales, pulmonares, tenias y trematodes.
Especies a las que se destina:
Ovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 1 ml cada 10 k.p.v.
Trematodes: 1,25 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto.
Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Albendazole.....3.8 g
Cobalt sulfate.....0.46 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of parasitosis caused by gastrointestinal and lung parasites, tapeworms and trematodes.
Animal species to which it is intended:
Sheep.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Gastrointestinal and lung parasites, and tapeworms: 1 ml every 10 k.l.w.
Trematodes: 1.25 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Bottle containing 1 liter. Bucket containing 5 liters.

Antiparasitarios Internos. Orales | Internal Antiparasitics. Oral

Albendazol

OVER (Overzol) 10 Co



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Albendazol.....10 g
Sulfato de cobalto.....1,3 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis producidas por nematodos gastrointestinales y pulmonares; tenias y trematodes.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral o intrarruminal.
Dosificación:
Nematodos gastrointestinales y pulmonares: 5 ml cada 100 k.p.v. **Tenias y trematodes:** 10 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Botella con 1 de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Albendazole.....10 g
Cobalt sulfate.....1.3 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of parasitosis caused by gastrointestinal and lung parasites; tapeworms and trematodes.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral or intraruminal route.
Dosage:
Gastrointestinal and lung nematodes: 5 ml every 100 k.l.w. **Tapeworms and trematodes:** 10 ml every 100 k.l.w.
Presentation:
Bottle containing 1 liter. Bucket containing 5 liters.

Eleval
OVINOS



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Albendazol.....2,5 g
Levamisol clorhidrato.....3,75 g
Cloruro de cobre anhidro.....0,45 g
Cloruro de cobalto.....0,1 g
Sulfato de zinc.....0,165 g
Selenito de sodio.....0,109 g
Iodo bisublimado.....0,1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis producidas por formas maduras e inmaduras de nematodos gastrointestinales y pulmonares, tenias y *Fasciola hepatica* adulta.
Especies a las que se destina:
Ovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 ml cada 5 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto. Bidón mochila con 2,5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Albendazole.....2.5 g
Levamisole hydrochloride.....3.75 g
Anhydrous copper chloride.....0.45 g
Cobalt chloride.....0.1 g
Zinc sulfate.....0.165 g
Sodium selenite.....0.109 g
Bisublimated iodine.....0.1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of parasitosis caused by adult and immature forms of gastrointestinal and pulmonary nematodes, tapeworms and adult *Fasciola hepatica*.
Animal species to which it is intended:
Sheep.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 ml every 5 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml. Jerry can (backpack type) containing 2.5 liters.

Overcox
2,5%



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Toltrazuril.....2,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de coccidiosis.
Especies a las que se destina:
Pollos, pavos y gansos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 litro cada 1000 litros de agua.
Presentación:
Frascos con 100, 250 y 500 ml de contenido neto. Botella con 1 litro de contenido neto. Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Toltrazuril.....2.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of coccidiosis.
Animal species to which it is intended:
Chickens, turkeys and gooses.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 liter every 1000 liters of water.
Presentation:
Vials containing 100, 250, 500 ml. Bottle containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Overcox
5%



Descripción:
Coccidicida.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Toltrazuril.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de coccidiosis.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Bovinos: 3 ml cada 10 k.p.v. **Porcinos:** 1 ml cada 2,5 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 100, 500 ml y 1 litro de contenido neto. Incluye dosificador oral y toallas desinfectantes.

Description:
Coccidicide.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Toltrazuril.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of coccidiosis.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Cattle: 3 ml every 10 k.l.w. **Swine:** 1 ml every 2.5 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100 ml, 500 ml or 1 liter. It includes an oral doser and disinfectant towels.

Overfen
10%



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fenbendazol.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis provocadas por nematodos gastrointestinales y pulmonares; y cestodos.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Nematodos: 2,5 ml cada 50 k.p.v.
Cestodos: 5 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto.
Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Fenbendazole.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of parasitosis caused by gastrointestinal and lung nematodes; and cestodes.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Nematodes: 2.5 ml every 50 k.l.w.
Cestodes: 5 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Bottle containing 1 liter.
Jerry can containing 5 liters.

Overfen
PREMIX PORCINOS



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Fenbendazol.....4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales y pulmonares con efecto adulticida, larvicida y ovicida.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
3 g cada 25 k.p.v. mezclados con la ración.
Presentación:
Pote con 1 kg de contenido neto. Balde con 5 kg de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Fenbendazole.....4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of gastrointestinal and lung parasitosis with adulticidal, larvicidal and ovicidal effects.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Administration:
By oral route.
Dosage:
3 g every 25 k.l.w., mixed with the food ration.
Presentation:
Pot containing 1 kg. Bucket containing 5 kg.

Triclabendazol
5% OVER



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Triclabendazol.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.p
Indicaciones:
Control de infestaciones de *Fasciola hepatica* y *Fasciola gigantica* adultas e inmaduras.
Especies a las que se destina:
Ovinos y caprinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
2 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Bidón mochila con 2,5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Triclabendazole.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of infestations caused by adult and immature stages of *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica.*
Animal species to which it is intended:
Sheep and goats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
2 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Jerry can (backpack type) containing 2,5 liters.

Triclabendazol
10% OVER



Descripción:
Antiparasitario interno. Saguaypicida.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Triclabendazol.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de infestaciones de *Fasciola hepatica* y *Fasciola gigantica* adultas e inmaduras.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 ml cada 8 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.
Bidón mochila con 2,5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic. Fasciolicide.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Triclabendazole.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of infestations caused by adult and immature stages of *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica*.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 ml every 8 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml. Jerry can (backpack type) containing 2.5 liters.

Antiparasitarios Internos. Orales | Internal Antiparasitics. Oral

Vermox
5 Co ORAL



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Oxfendazol.....5 g
Cloruro de cobalto.....0,23 g
Agentes de formulación .....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de formas maduras e inmaduras de parásitos pulmonares, gastrointestinales y tenias. Posee acción ovicida.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Bovinos: 1 ml cada 20 k.p.v. *Ostertagia spp.*: Doble dosis de 1 ml cada 10 k.p.v.
Equinos: 1 ml cada 5 k.p.v. **Ovinos y caprinos:** 1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto.
Bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Oxfendazole.....5 g
Cobalt chloride.....0.23 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control and treatment of adult and immature stages of lung and gastrointestinal parasites, and tapeworms. It provides an ovicide action.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep and goats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Cattle: 1 ml every 20 k.l.w. *Ostertagia spp.:* 1 ml every 10 k.l.w. (double dose).
Horses: 1 ml every 5 k.l.w. **Sheep and goats:** 1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Bottle containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Vermox
10 Co I.R.



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Oxfendazol.....10 g
Cloruro de cobalto.....0,23 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de formas maduras e inmaduras de parásitos pulmonares y gastrointestinales; y tenias. Posee acción ovicida.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intrarruminal.
Dosificación:
1 ml cada 40 k.p.v. *Ostertagia spp.*: 1 ml cada 20 k.p.v.
Presentación:
Bidón mochila con 2 litros de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Oxfendazole.....10 g
Cobalt chloride.....0.23 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of adult and immature stages of lung and gastrointestinal parasites; and tapeworms. It provides an ovicidal action.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intraruminal route.
Dosage:
1 ml every 40 k.l.w. *Ostertagia spp.*: 1 ml every 20 k.l.w.
Presentation:
Jerry can (backpack type) containing 2 liters.

NUEVO !

Fipronil + Ivermectina

over®

www.over.com.ar



Overline LARGE DUO

ACCIÓN COMBINADA FRENTE A GARRAPATAS Y NEMATODOS
FÁCIL APLICACIÓN CON SISTEMA BACKPACK

30 DÍAS DE PODER RESIDUAL ABSOLUTO CONTRA GARRAPATAS

71 DÍAS DE RETIRO EN CARNE

Overline large duo. Combined action against ticks and nematodes. Easy application with backpack system. 30 days of absolute residual power against ticks. Meat withdrawal time of 71 days.

HEMOPARASITICIDAS
HEMOPARASITICIDES

06

Inyectables / Injectable

Imidover

Overseg COMPUESTO L.P.U.

Overseg PLUS OXI

Imidover



Descripción:
Hemoparasiticida.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Dipropionato de imidocarb.....12 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de babesiosis *(Babesia bigemina* y *Babesia bovis)* y anaplasmosis *(Anaplasma marginale).*
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
2,5 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 15 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Hemoparasiticide.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Imidocarb dipropionate.....12 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of babesiosis *(Babesia bigemina* and *Babesia bovis)* and anaplasmosis *(Anaplasma marginale).*
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
2.5 ml every 100 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 15 or 100 ml.

Antiparasitarios Hemoparasiticidas. Inyectables | Hemoparasiticides. Injectable

Overseg
COMPUESTO LPU



Descripción:
Piroplasmicida. Antipirético. Vitamínico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Diminacene diaceturato.....4 g
Dipirona.....40 g
Vitamina B12.....0,004 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de piroplasmosis, de premunición y en casos de pérdida de inmunidad.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramuscular.
Dosificación:
7,5 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description:
Piroplasmid killer. Antipyretic. Vitaminic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Diminazene diaceturate.....4 g
Dipyrone.....40 g
Vitamin B12.....0.004 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of piroplasmosis, premunition and loss of immunity.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramuscular route.
Dosage:
7.5 ml every 100 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 50 ml.

Overseg
PLUS OXI



Descripción:
Quimioterápico.
Fórmula:
Cada frasco de 12 g de polvo contiene:
Diminacene diaceturato.....1 g
Oxitetraciclina clorhidrato.....3,41 g
Dipirona.....7,5 g
Vitamina B12.....0,001 g
Cada frasco con solvente contiene:
Clorhidrato de lidocaína.....0,18 g
Agentes de formulación c.s.p.....18 ml
Indicaciones:
Tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis. Detiene la destrucción de glóbulos rojos y elimina los malestares en el animal afectado.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramuscular.
Dosificación:
25 ml cada 300 k.p.v.
Presentación:
Caja con 1 frasco de polvo soluble y 1 frasco de solvente.

Description:
Chemotherapeutic.
Formula:
Every vial with 12 g of powder contains:
Diminazene diaceturate.....1 g
Oxytetracycline hydrochloride.....3.41 g
Dipyrone.....7.5 g
Vitamin B12.....0.001 g
Every vial with solvent contains:
Lidocaine hydrochloride.....0.18 g
Formulation agents q.s to.....18 ml
Indications:
Treatment of anaplasmosis and piroplasmosis. It stops the destruction of red blood cells and eliminates discomforts in the affected animal.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramuscular route.
Dosage:
25 ml every 300 k.l.w.
Presentation:
Boxes containing 1 vial with soluble powder and 1 vial with solvent.

over®

LÍNEA HEMOPARASITICIDA OVER





Imidover

Imidocarb 12%

Indicado para el tratamiento
de anaplasmosis y piroplasmosis.

Inyectable, intramuscular
o subcutáneo.

Hemoparasiticides OVER. IMIDOVER. Imidocarb 12%.
It is indicated for the treatment of anaplasmosis and piroplasmosis.
It is injectable via intramuscular or subcutaneous route.

www.over.com.ar

AMBIENTALES
ENVIRONMENTAL PRODUCTS

07

Mosquicidas y Larvicidas / Fly Killers and Larvicides

Overfly CEBO SÓLIDO
Overfly CONCENTRADO LARVA 50
Overfly LARVA 10
Overfly PLUS LARVA 10
Synect AMBIENTAL
Synect AMBIENTAL ULTRA

Overfly
CEBO SÓLIDO



Descripción:
Mosquicida.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Metomil.....5 g
(Z)-9-Tricoseno.....0,025 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de la mosca común *(Musca domestica).*
Especies a las que se destina:
Se utiliza en establecimientos pecuarios.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Esparcir 250 g cada 100 m^2.
Presentación:
Caja con 10 sobres de 50 g de contenido neto cada uno. Caja con trampa atrapamoscas y un sobre de 50 g de contenido neto.

Description:
Fly killer.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Methomyl.....5 g
(Z)-9-Tricosene.....0.025 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of common flies *(Musca domestica).*
Animal species to which it is intended:
To be used in livestock farms.
Administration:
External use.
Dosage:
Spread 250 g every 100 m^2.
Presentation:
Box containing 10 pouches with 50 g each. Box with a flytrap and a pouch containing 50 g.

Overfly
CONCENTRADO LARVA 50



Descripción:
Larvicida.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Triflumurón.....50 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de larvas de la mosca común *(Musca domestica).*
Especies animales a las que se destina:
Se utiliza en establecimientos pecuarios.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Suspender 100 g cada 10 litros de agua.
Presentación:
Potes con 100 g, 200 g, 400 g, 500 g y 1 kg de contenido neto.

Description:
Larvicide.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Triflumuron.....50 g
Formulation agents.....q.s
Indications:
Control of the common fly *(Musca domestica)* larvae.
Animal species to which it is destined:
To be used in livestock farms.
Administration:
External use.
Dosification:
Apply 100 g every 10 liters of water.
Presentation:
Pots containing 100 g, 200 g, 400 g, 500 g or 1 kg.

Overfly
LARVA 10



Descripción:

Larvicida.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Triflumurón.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.

Indicaciones:

Control de larvas de la mosca común *(Musca domestica).*

Especies animales a las que se destina:

Se utiliza en establecimientos pecuarios.

Administración:

Uso Externo.

Dosificación:

Suspender 50 ml por litro de agua. Se aplica sobre la superficie a tratar con equipos pulverizadores, asperjando 1 litro de preparado cada 10 m^2.

Presentación:

Frascos con 50, 100 y 500 ml de contenido neto. Bidones con 1 y 5 litros de contenido neto.

Description:

Larvicide..

Formula:

Every 100 ml, it contains:

Triflumuron.....10 g
Formulation agents.....q.s.

Indications:

Control of the common fly *(Musca domestica)* larvae.

Animal species to which it is destined:

To be used in livestock farms.

Administration:

External use.

Dosification: Apply 50 ml per each liter of water. It must be administered over the surface to be treated with the aid of sprayers at a rate of 1 liter of preparation per each 10 m^2.

Presentation:

Vials containing 50, 100 or 500 ml. Jerry cans containing 1 or 5 liters.

Ambientales. Mosquicidas y Larvicidas
Environmental Products. Larvicide

Overfly
PLUS
LARVA 10



Descripción:

Larvicida.

Fórmula:

Cada 100 ml contiene:

Triflumurón.....10 g
Geraniol.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.

Indicaciones:

Control de larvas de la mosca común *(Musca doméstica).*

Especies animales a las que se destina:

Se utiliza en establecimientos pecuarios.

Administración:

Uso externo.

Dosificación:

Suspender 50 ml cada 10 litros de agua limpia y aplicar sobre la superficie a tratar con equipos pulverizadores, asperjando 1 litro de preparado cada 10 m^2.

Presentación:

Frascos con 100 , 200 y 500 ml de contenido neto. Bidones con 1 y 5 litros de contenido neto.

Description:

Larvicide.

Formula:

Every 100 ml, it contains:

Triflumuron.....10 g
Geraniol.....20 g
Formulation agents.....q.s.

Indications:

Control of the common fly *(Musca domestica)* larvae.

Animal species to which it is destined:

To be used in livestock establishments.

Administration:

External use.

Dosage: Apply 50 ml every 10 liters of clean water. It must be administered over the surface to be treated with the aid of sprayers at a rate of 1 liter of preparation per each 10 m^2.

Presentation:

Vials containing 100, 200 or 500 ml. Jerry cans containing 1 or 5 litres.

Synect
AMBIENTAL



Descripción:
Insecticida. Repelente.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....10 g
Butóxido de piperonilo.....15 g
Piriproxifeno.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de insectos en instalaciones rurales e industriales, tambos, salas de ordeñe, caballerizas, parideras, galpones, etc.
Administración:
Por aspersión, pulverización o rociado.
Dosificación:
1 litro cada 500 litros de agua.
Presentación:
Bidones autodosificables con 100 ml y 1 litro de contenido neto.

Description:
Insecticide. Repellent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....10 g
Piperonyl butoxide.....15 g
Pyriproxyfen.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of insects in rural and industrial facilities, dairy farms, milking rooms, studs, farrowing barns, sheds, etc.
Administration:
By spraying.
Dosage:
1 liter every 500 liters of water.
Presentation:
Self-dossing jerry cans containing 100 ml or 1 liter.

Ambientales. Mosquicidas y Larvicidas
Environmental Products. Fly Killer

Synect
AMBIENTAL ULTRA



Descripción:
Insecticida. Repelente.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.....20 g
Butóxido de piperonilo.....40 g
Piriproxifeno.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de insectos en instalaciones rurales e industriales, tambos, salas de ordeñe, caballerizas, parideras, galpones, etc.
Administración:
Por aspersión.
Dosificación:
2,5 ml cada 5 litros de agua.
Presentación:
Frascos con 100 ml y 1 litro de contenido neto. Caja dispenser con 12 frascos de 50 ml cada uno.

Description:
Insecticide. Repellent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Cypermethrin.....20 g
Piperonyl butoxide.....40 g
Pyriproxyfen.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of insects in rural and industrial facilities, dairy farms, milking rooms, studs, farrowing barns, sheds, etc.
Administration:
By spraying.
Dosage:
2.5 ml every 5 liters of water.
Presentation:
Vials containing 100 ml or 1 liter. Dispensing box containing 12 vials with 50 ml each.

ANTISÉPTICOS, DESINFECTANTES Y CREMAS PROTECTORAS
ANTISEPTICS, DISINFECTANTS AND PROTECTIVE CREAMS

08

Líquidos / Liquid
A.C. 10
Curapezuñas CONCENTRADO
Iodofos
Pervivet
Tintura de Iodo FUERTE F.A.
Ultrafect

Cremas / Creams
Crema de ORDEÑO OVER
Crema Dérmica OVER

A.C. 10



Descripción:
Antiséptico. Desinfectante. Detergente. Viricida. Bactericida. Antimicótico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cloruro de benzalconio.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Limpieza y desinfección de toda clase de superficies, equipos, locales, gallineros, tambos, parideras, instrumental quirúrgico y agua de bebida.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Granjas y avicultura: Desinfección de instalaciones, implementos y agua de bebida: 1 l cada 7000 l de agua. **Tambo y ganadería:** Desinfección y lavado de máquina de ordeño y accesorios: 1 l cada 3500 l de agua; desinfección de instalaciones y de agua de bebida: 1 l cada 7000 l de agua; lavado de ubres y manos: 1 l cada 1500 l de agua. **Producción porcina:** Desinfección de instalaciones, implementos y agua de bebida: 1 l cada 7000 l de agua. **Clínica y cirugía:** 1 l cada 100 l de agua.
Presentación:
Botellas con 1 y 5 litros de contenido neto.

Description:
Antiseptic. Disinfectant. Detergent. Virucide. Bactericide. Antimycotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Benzalkonium chloride.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cleaning and disinfection of all kinds of surfaces, equipment, premises, chicken coops, dairy farms, farrowing barns, surgical instruments and the drinking water.
Administration: External use.
Dosage: Farms and poultry breeding: 1 liter every 7,000 liters of water to disinfect premises, implements and the drinking water. **Dairy farms and animal breeding:** 1 liter every 3,500 liters of water to disinfect and wash milking machines and accessories; 1 liter every 7,000 liters of water to disinfect premises and the drinking water; 1 l every 1,500 liters of water to wash udders and the milker's hands. **Pig farming:** 1 liter every 7,000 liters of water to disinfect premises, implements and the drinking water. **Clinic and surgery:** 1 liter every 100 liters of water.
Presentation:
Bottles containing 1 or 5 liters.

Antisépticos, Desinfectantes y Cremas Protectoras. Líquidos | Antiseptics and Disinfectants. Liquid

Curapezuñas
CONCENTRADO



Descripción:
Antiséptico. Desinfectante podal.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Formol al 40%.....50 g
Cloruro de benzalconio.....5 g
Sulfato de cobre.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de la necrobacilosis podal (pietín).
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
Topicaciones: Puro. **Pediluvios:** 1 litro cada 40 litros de agua.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Antiseptic. Foot disinfectant.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Formol at 40%.....50 g
Benzalkonium chloride.....5 g
Copper sulfate.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of foot necrobacillosis (foot rot).
Animal species to which it is destined:
Cattle and sheep.
Administration:
Local use.
Dosage:
Local application: Pure. **Foot-baths:** 1 liter every 40 liters of water.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Iodofos



Descripción: Antiséptico. Desinfectante.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Iodo bisublimado.....2 g
Ácido fosfórico.....3 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Limpieza y desinfección de toda clase de superficies, equipos, locales, gallineros, tambos, instrumental quirúrgico y agua de bebida.
Administración: Uso externo.
Dosificación: Desinfección general: Instrumental quirúrgico, pisos, paredes, techos y jaulas de madera: 9 ml por litro. Comederos, bebederos y jaulas de metal: 5 ml por litro. Agua de bebida: 6 ml cada 5 litros. **Avicultura:** Criaderos, incubadoras y galpones: 9 ml por litro. Jaulas y equipos en general: 5 ml por litro. Agua de bebida: 6 ml cada 5 litros. Higiene ambiental: 20 ml por litro. **Tambos:** Máquinas de ordeñe: 6 ml cada 5 litros. Sistema de caños, tarros, botellas, tanques de leche a granel: 6 ml cada 5 litros. Limpieza de ubres y pezones: 12 ml por litro. Sellado de pezones: 100 ml por litro. Sarro: Puro. **Tiña:** Aplicar mojando con toalla o algodón: 12 ml por litro.
Presentación: Botella con 1 litro y bidón con 5 litros de contenido neto.

Description: Antiseptic. Disinfectant.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Bisublimated iodine.....2 g
Phosphoric acid.....3 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cleaning and disinfection of all kinds of surfaces, equipment, premises, chicken coops, dairy farms, surgical instruments and the drinking water.
Administration: External use.
Dosage: General disinfection: 9 ml per liter for surgical instruments, floors, walls, roofs and wooden cages; 5 ml per liter for feeding troughs, water troughs and metal cages; 6 ml every 5 liters for the drinking water. **Poultry breeding:** 9 ml per liter for rearing pens, incubators and sheds; 5 ml per liter for cages and general equipment in general; 6 ml every 5 liters for the drinking water; 20 ml per liter to clean up the place. **Dairy farms:** 6 ml every 5 liters for milking machines; 6 ml every 5 liters for pipes, cans, bottles, bulk milk tanks; 12 ml per liter for cleaning udders and teats; 100 ml per liter for teat sealing. **Ringworm:** 12 ml per liter; apply by drenching the area with a towel or a piece of cotton.
Presentation: Bottle containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Antisépticos, Desinfectantes y Cremas Protectoras. Líquidos
Antiseptics and Disinfectants. Liquid



Pervivet



Descripción: Antiséptico y desinfectante.
Formula: Cada 100 ml contiene:
Iodopovidona.....10 g
Agentes de formulación.....c.s
Indicaciones: Tratamiento de piodermatitis, dermatomicosis, lesiones vesiculares de origen viral, heridas de castración, descorne, descole, desinfección de cordón umbilical. Antisepsia de campo quirúrgico. Desinfección de instalaciones, mesadas de trabajo, instrumental quirúrgico. Pietín.
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos. Instalaciones, mesadas de trabajo, instrumental quirúrgico.
Administración: Uso local, diluido o puro.
Dosificación: Pediluvios: 1 litro cada 10 litros de agua. **Sanitización de mesadas y piletas:** 20 a 50 ml cada 10 litros de agua. **Desinfección de pisos:** 100 ml cada 10 litros de agua. **Antisepsia de campo quirúrgico:** Puro. **Desinfección de instrumental:** 20 a 30 ml por 1 litro de agua. **Tratamiento y prevención de infecciones cutáneas y heridas:** Usar puro en forma de topicaciones. **Tiña, aftas bucales y podales:** Puro, cada 12 hs en forma de topicaciones.
Presentación: Botella con 1 litro de contenido neto.

Description: Local disinfectant and antiseptic.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Iodopovidone.....10 g
Formulation agents..... q.s.
Indications: Treatment of pyodermatitis, dermatomycosis, vesicular lesions of viral origin, castration wounds, dehorning, tailing and disinfection of the umbilical cord. Surgical field antisepsis. Disinfection of facilities, work counters and surgical instruments. Foot rot.
Animal species to which it is intended: Cattle, horses, swine, sheep, goats, dogs and cats.
Administration: Locally, diluted or pure.
Dosage: Foot bath: 1 liter of product every 10 liters of water. **Sanitization of countertops and sinks:** 20 to 50 ml of product every 10 liters of water. **Disinfection of floors:** 100 ml of product every 10 liters of water. **Surgical field antisepsis:** Apply it pure. **Disinfection of instruments:** 20-30 ml every 1 liter of water. **Treatment and prevention of skin infections and wounds:** Use pure in the form of topications. **Ringworm, foot and mouth aphtha:** Apply the product every 12 hours in the form of topications.
Presentation: Bottle containing 1 liter.

Tintura de Iodo

FUERTE F.A.



Descripción:
Antiséptico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Iodo metálico.....7 g
Ioduro de potasio.....5 g
Agua destilada.....5 ml
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Antisepsia de heridas, piel y campo operatorio. Infecciones por hongos y bacterias. Tiña y epidermofitosis.
Especies a las que se destina:
Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos, felinos y aves.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
Diluir al 30% de la solución pura.
Presentación:
Frasco con 250 ml de contenido neto.

Description:
Antiseptic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Metallic iodine.....7 g
Potassium iodine.....5 g
Distilled water.....5 ml
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Antisepsis of wounds, skin and surgical area. Fungal and bacterial infections. Ringworm and epidermophytosis.
Animal species to which it is destined:
Horses, cattle, sheep, goats, swine, dogs, cats and poultry.
Administration:
Local use.
Dosage:
Dilute pure solution up to 30%.
Presentation:
Vial containing 250 ml.

Antisépticos, Desinfectantes y Cremas Protectoras. Líquidos
Antiseptics and Disinfectants. Liquid

Ultrafect



Descripción:
Antiséptico. Desinfectante. Antimicótico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cloruro de benzalconio.....20 g
Glutaraldehído.....10 g
Formaldehído.....10 g
Alcohol isopropílico.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Desinfección de locales, edificios, granjas, utensilios, equipos, transportes, material ganadero, avícola e industrial.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Desinfección: 1 litro cada 1000 litros de agua. **Prevención de enfermedades infecciosas:** 1 litro cada 500 litros de agua. **Pediluvio:** 1 litro cada 300 litros de agua.
Presentación:
Botella con 1 litro de contenido neto.

Description:
Antiseptic. Disinfectant. Antimycotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Benzalkonium chloride.....20 g
Glutaraldehyde.....10 g
Formaldehyde.....10 g
Isopropyl alcohol.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Disinfection of premises, buildings, farms, utensils, equipments, transport means, as well as livestock, poultry and industrial material.
Administration:
External use.
Dosage:
Disinfection: 1 liter every 1,000 liters of water. **Prevention of infectious diseases:** 1 liter every 500 liters of water. **Foot baths:** 1 liter every 300 liters of water.
Presentation:
Bottle containing 1 liter.

Crema de Ordeño

OVER



Descripción:
Cicatrizante. Protectora. Lubricante. Antiséptica. Anestésica.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Vitamina A palmitato.....0,07 g
Benzalconio cloruro .....1 g
Silicona.....2 g
Lidocaína clorhidrato.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y profilaxis de erosiones, grietas, heridas y escoriaciones en general. Piel seca y áspera de pezones y ubre.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
Cubrir y masajear la región a tratar.
Presentación:
Pote con 500 g de contenido neto. Caja con 6 pomos de 200 g de contenido neto.

Description:
Cream with healing, protective, lubricating, antiseptic and anesthetic properties.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Vitamin A palmitate.....0.07 g
Benzalkonium chloride.....1 g
Silicone.....2 g
Lidocaine hydrochloride.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prophylaxis of erosions, cracks, wounds and general skin detaching. Dry and rough skin on teats and udders.
Animal species to which it is destined:
Cattle, horses, swine, sheep, dogs and cats.
Administration:
Local use.
Dosage:
Cover and massage the area to be treated.
Presentation:
Pot containing 500 g. Box containing 6 collapsible tubes with 200 g each.

Antisépticos, Desinfectantes y Cremas Protectoras. Cremas | Antiseptics and Disinfectants. Cream

Crema Dérmica

OVER



Descripción:
Cicatrizante. Suavizante. Lubricante. Protectora.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Vitamina A palmitato.....0,07 g
Agentes de formulación.....c.s.
Contiene Aloe vera, Cera de abejas y Esperma de ballena.
Indicaciones:
Profilaxis y tratamiento de erosiones, grietas, heridas y escoriaciones en general. Piel seca y áspera.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.
Administración:
Uso local.
Dosificación:
Cubrir y masajear la región a tratar.
Presentación:
Pomo con 200 g de contenido neto.

Description:
Cream with healing, smoothing, lubricating and protective properties.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Vitamin A palmitate.....0.07 g
Formulation agents.....q.s.
It contains: Aloe vera, bee wax and whale sperm.
Indications:
Prophylaxis and treatment of erosions, cracks, wounds and general skin detaching. Dry and rough skin.
Animal species to which it is destined:
Cattle, horses, swine, sheep, dogs and cats.
Administration:
Local use.
Dosage:
Cover and massage the area to be treated.
Presentation:
Collapsible tube containing 200 g.



MENBUTIOX

MEJORA LOS PROCESOS DIGESTIVOS

MODULADOR GÁSTRICO,
DUODENAL Y BILIAR

It improves the digestive processes.
Gastric duodenal and biliary modulator.



over® www.over.com.ar

CARMINATIVOS
CARMINATIVES

09

Polixane
Polixane POLVO
Rumex
Rumex 800 CONCENTRADO
Rumex PREMIX

Polixane



Descripción:
Carminativo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Dimetilpolisiloxano activado.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención del meteorismo (timpanismo o empaste), flatulencias, aerofagia, distención y dolores abdominales post operatorios, cólicos y diarreas fermentativas.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía oral, intrarruminal o intracecal.
Dosificación:
Preventiva: 50 ml cada 1000 litros de agua de bebida. **Curativa:** 10 ml cada 100 ml de agua y administrar según las siguientes dosis: bovinos y equinos adultos: 100 ml; potrillos, terneros, porcinos y ovinos: 25 ml; caninos y felinos: 10 ml.
Presentación:
Botella con 1 litro y bidón con 5 litros de contenido neto.

Description:
Carminative.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Activated dimethylpolysiloxane.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention and treatment of meteorism (tympanites or bloat), flatulence, aerophagia, post-surgery abdominal pains and distension, colics and fermentative diarrhea.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine, sheep, dogs and cats.
Administration:
By oral, intraruminal or intracaecal route.
Dosage:
Preventive dosage: 50 ml every 1,000 liters of the drinking water. **Curative dosage:** 10 ml every 100 ml of water, administered as follows: 100 ml (adult cattle and horses), 25 ml (colts, calves, sheep and swine), 10 ml (dogs and cats).
Presentation:
Bottle containing 1 liter. Jerry can containing 5 liters.

Carminativos | Carminatives

Polixane
POLVO



Descripción:
Carminativo.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Dimetilpolisiloxano polvo.....50 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención del meteorismo (timpanismo o empaste) gaseoso o espumoso.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Vía oral sobre la ración o mezclado con ella.
Dosificación:
Bovinos grandes: 1 g por animal por día. **Bovinos medianos:** 0,5 g por animal por día. **Ovinos:** 0,25 g por animal por día.
Presentación:
Pote con 500 g de contenido neto. Baldes con 5 y 10 kg de contenido neto.

Description:
Carminative.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Dimethylpolysiloxane powder.....50 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of gaseous or foamy meteorism (tympanites or bloat).
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
By oral route, over the ration or mixed with it.
Dosage:
Cattle (big animals): 1 g per day and per animal. **Medium-sized cattle:** 0.5 g per day and per animal. **Sheep:** 0.25 g per day and per animal.
Presentation:
Pot containing 500 g. Buckets containing 5 or 10 kg.

Rumex



Descripción:
Carminativo con minerales.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Genapol PF 10.....2 g
Genapol C-070.....8 g
Sulfato de cobalto heptahidratado.....0,001 g
Sulfato de cobre pentahidratado..0,0039 g
Selenito de sodio.....0,0005 g
Iodo bisublimado.....0,001 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención del meteorismo (timpanismo y empaste) producido por el pastoreo de leguminosas. Aporta elementos trazas esenciales. Ayuda en la prevención de la deficiencia de minerales.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
8 ml cada 100 k.p.v. 50 a 80 ml diluidos en 100 litros de agua de bebida.
Presentación:
Balde con 20 litros de contenido neto.

Description:
Carminative with minerals.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Genapol PF 10.....2 g
Genapol C-070.....8 g
Cobalt sulfate heptahydrate.....0.001 g
Copper sulfate pentahydrate.....0.0039 g
Sodium selenite.....0.0005 g
Bisublimated iodine.....0.001 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of the meteorism (tympanites and bloat) affecting the cattle grazing on leguminous plants. It provides essential trace elements. It helps to prevent mineral deficiencies.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route.
Dosage:
8 ml every 100 k.l.w.; 50 to 80 ml diluted in 100 liters of the drinking water.
Presentation:
Bucket containing 20 liters.

Carminativos | Carminatives

Rumex 800 CONCENTRADO



Descripción:
Carminativo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Alcohol láurico polioxietilenado con 23 moles de óxido de etileno.....80 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención y tratamiento del empaste o timpanismo espumoso.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
2,5 ml cada 100 k.p.v. 15 ml cada 100 litros de agua de bebida en verano. 25 ml cada 100 litros de agua de bebida en otoño/primavera.
Presentación:
Balde con 20 litros de contenido neto.

Description:
Carminative.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Polyoxyethylene (23) lauryl alcohol....80 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of foamy bloat or tympanites.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route.
Dosage:
2.5 ml every 100 k.l.w.; 15 ml every 100 liters of the drinking water, in summer; 25 ml every 100 liters of the drinking water, in autumn or spring.
Presentation:
Bucket containing 20 liters.

Rumex
PREMIX



Descripción:
Carminativo.
Formula:
Cada 100 g contiene:
Alcohol laurílico etoxilado.....10 g
Agentes de formulación.....c.s
Indicaciones:
Indicado en el tratamiento y control del meteorismo espumoso en bovinos.
Especies animales a las que se lo destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento.
Dosificación: 8 g de producto cada 100 k.p.v. Esta dosis puede incrementarse según la gravedad del caso. En animales con riesgo de muerte por empaste se pueden administrar hasta 5 veces la dosis.
El producto se administra cada 24 horas. Se recomienda iniciar el tratamiento 5 ó 7 días antes de poner los animales en las pasturas empastadoras y continuarlo durante el tiempo de exposición.
Presentación:
Bolsas con 5, 10 y 20 kg de contenido neto.

Description:
Carminative.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Ethoxylated lauryl alcohol.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of the foamy meteorism affecting cattle.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route, mixed with the food.
Dosage:
8 g of product every 100 k.l.w. This dose can be increased according the disease severity. In animals that may die due to the bloat condition, this dose can be increased five times.
The product is administered every 24 hours. It is recommended to begin the treatment 5 or 7 days before exposing the animals to the bloating pastures and continue it as long as the exposition lasts.
Presentation:
Bags containing 5, 10 or 20 kg.

REPRODUCTIVOS Y HORMONALES

REPRODUCTIVE MEDICINES AND HORMONALS

10

Inyectables / Injectable
Deslogest
Estradiol MULTIDOSIS
Estradiol OVER
Estrosinc
Forcecarb
Gestar
Overgest
Oxitocina FUERTE OVER
Oxitocina OVER
Prostal

Dispositivos intravaginales / Devices
Sincrover 700
Sincrover 1000

Deslogest



Descripción:
Hormonal.
Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Acetato de deslorelina.....1,8 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Inducción de la ovulación dentro de las 48 hs, durante el estro en yeguas con ciclos normales cuyos folículos ováricos tengan un diámetro superior a 30 mm.
Especies a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Vía intramuscular, en la tabla del cuello.
Dosificación:
1 ml por animal.
Presentación:
Caja con 5 ampollas de 1 ml de contenido neto cada una.

Description:
Hormonal.
Formula:
Every 1 ml, it contains:
Deslorelin acetate.....1.8 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Induction of ovulation within 48 hours since administered, during the estrus of mares with ovarian follicles longer than 30 mm in diameter and normal cycles.
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
By intramuscular route on the neck base.
Dosage:
1 ml per animal.
Presentation:
Box containing 5 ampoules with 1 ml each.

Estradiol
MULTIDOSIS



Descripción: Endocrino.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Estradiol benzoato.....0,1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de anestros, expulsión de placenta retenida y fetos momificados, expulsión de pus en piómetras, inducción al celo, hipertrofia prostática en perros, terapia de reemplazo en perras castradas, falsa preñez en perras y para impedir la implantación del huevo fecundado en perras con servicio indebido.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Dosis orientativa: 0,02 a 0,1 ml por k.p.v.
Vacas: Infecundidad, anestros y cuerpo lúteo persistente: 3 a 5 ml; metritis, piómetras, placenta retenida y fetos momificados: 5 a 10 ml. **Yeguas:** 5 a 10 ml. **Ovejas:** 2 a 3 ml. **Cerdas:** 2 a 4 ml. **Perras y gatas:** 0,01 a 0,1 ml por k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Endocrine.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Estradiol benzoate.....0.1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of anestrus, expulsion of retained placenta and mummified fetuses, pus discharge in pyometra, heat induction, prostatic hypertrophy in dogs, replacement therapy in spayed bitches, false pregnancy in bitches, prevention of egg implantation in bitches suffering undesired matings.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, swine, horses, cats and dogs.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
Suggested dose: 0.02 to 0.1 mg per k.l.w.
Cows: 3 to 5 ml to treat infertility, anestrus and persistent corpus luteum; 5 to 10 ml to treat metritis, pyometra, retained placenta and mummified fetuses. **Mares:** 5 to 10 ml. **Ewes:** 2 to 3 ml. **Sows:** 2 to 4 ml. **Bitches and female cats:** 0.01 to 0.1 ml per k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50 or 100 ml.

Estradiol
OVER



Descripción:
Endocrino.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Benzoato de estradiol.....0,25 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de anestros, expulsión de placenta retenida, fetos momificados y pus en piómetras. Sincronización de celo.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
1,2 ml a 4 ml. Sincronización de celo: 0,4 a 0,8 ml.
Presentación:
Frascos con 10 y 20 ml de contenido neto.

Description:
Endocrine.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Estradiol benzoate.....0.25 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of anestrus, expulsion of retained placenta, mummified fetuses, pus discharge in pyometra. Heat synchronization.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
1.2 ml to 4 ml. Heat synchronization: 0.4 to 0.8 ml.
Presentation:
Vials containing 10 or 20 ml.

Hormonales. Inyectables | Hormonals. Injectable

Estrosinc



Descripción:
Endocrino.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Estradiol cipionato.....0,05 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Complemento en la inducción y sincronización de celo con progestágenos, prostaglandinas y GnRH y en el tratamiento del anestro post parto.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
1 ml por animal.
Presentación:
Frascos con 10, 50 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Endocrine.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Estradiol cypionate.....0.05 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It complements heat induction and synchronization that is mediated by progestins, prostaglandins and GnRH. It complements the treatment of postpartum anestrus.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
1 ml per animal.
Presentation:
Vials containing 10, 50 or 100 ml.

Forcecarb



Descripción:
Hormonal.
Fórmula: Cada ml contiene:
Carbetocina.....0,05 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Vacas: Retención placentaria, regulación del parto. Tratamiento y prevención de mastitis y metritis. **Cerdas:** Agalactia, síndrome MMA, regulación del parto, retención láctea post parto. Sincronización del parto luego de aplicación de prostaglandinas.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Vía intramuscular o endovenosa muy lenta.
Dosificación:
Vacas: 0,3-0,4 ml cada 10 k.p.v. o 10 ml por vaca de 400 a 500 k.p.v. **Cerdas:** Regulación del parto, retención láctea post parto: 0,12 ml cada 10 k.p.v. o 0,2 ml por cerda de 150 a 170 k.p.v. Sincronización del parto: 0,7 a 1,4 ml por cerda 24 hs posteriores a la aplicación de prostaglandina. Otras indicaciones: 0,24 a 0,4 ml cada 10 k.p.v. o 4 ml por cerda de 150 a 170 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 10 ml.

Description:
Hormonal.
Formula: Every 1 ml, it contains:
Carbetocin.....0.05 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cows: Placental retention, parturition control. Treatment and prevention of mastitis and metritis. **Sows:** Agalactia, MMA syndrome, parturition control, post-parturition milk retention, synchronization of parturition after the application of prostaglandins.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
By intramuscular or very slow intravenous route.
Dosage:
Cows: 0.3 to 0.4 ml every 10 k.l.w. or 10 ml per cow weighing from 400 to 500 k.l.w. **Sows:** For parturition control and post-parturition milk retention, administer 0.12 ml every 10 k.l.w. or 0.2 ml per sow weighing from 150 to 170 k.l.w.; for synchronization of parturition, administer 0.7 to 1.4 ml per sow 24 hours after the application of prostaglandins. Other indications: Administer 0.24 to 0.4 ml every 10 k.l.w. or 4 ml per sow weighing from 150 to 170 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 10 ml.

Hormonales. Inyectables | Hormonals. Injectable

Gestar



Descripción: Hormonal.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Acetato de buserelina.....0,00042 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Vacas: Tratamiento de trastornos de la fertilidad de origen ovárico: quistes foliculares, aciclia, anestro, ovulación retardada y atresia folicular. Incrementa el índice de concepción en la inseminación artificial y después de la sincronización del celo. **Yeguas:** Tratamiento de trastornos quísticos de los ovarios acompañados o no de celo prolongado o permanente; y aciclia. Inducción de la ovulación (en celo prolongado, permanente, para fijar el tiempo de la ovulación y la monta, para mejorar el índice de concepción).
Especies a las que se destina: Bovinos y equinos.
Administración: Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa.
Dosificación: Vacas: Quistes foliculares, aciclia y anestro: 5 ml; ovulación retardada, atresia folicular, incremento del índice de concepción en la inseminación artificial y tras la sincronización del celo: 2,5 ml.
Yeguas: Trastornos quísticos de ovario, con o sin celo prolongado o permanente, inducción de la ovulación y monta, mejora del índice de concepción, celo prolongado o permanente: 10 ml; aciclia: 2 veces 5 ml con intervalo de 24 hs.
Presentación: Frasco con 50 ml de contenido neto. Caja con 12 frascos de 10 ml de contenido neto.

Description: Hormonal.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Buserelin acetate.....0.00042 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cows: It is indicated for the treatment of fertility disorders of ovarian origin, such as follicular cysts, acyclia, anestrus, delayed ovulation and follicular atresia. It increases the conception rate in the artificial insemination and after the heat synchronization. **Mares:** It is indicated for the treatment of ovarian cystic disorders developed with or without prolonged or permanent heat. Also indicated for the treatment of acyclia. It induces the ovulation in the case of prolonged or permanent heat and also to allow the determination of the ovulation and copulation times and increase the conception rate.
Animal species to which it is intended:
Cattle and horses.
Administration: By intramuscular, intravenous or subcutaneous route.
Dosage: Cows: For follicular cysts, acyclia and anestrus, administer 5 ml; for late ovulation, follicular atresia, and increase of conception rate in artificial insemination and after heat synchronization, administer 2.5 ml. **Mares:** For ovarian cystic disorders developed with or without prolonged or permanent heat, ovulation and copulation induction, increase of the conception rate, prolonged or permanent heat, administer 10 ml; for acyclia, administer 2 times 5 ml with a 24-hour interval in-between.
Presentation: Vial containing 50 ml. Boxes containing 12 vials with 10 ml each.

Overgest



Descripción:
Hormonal.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Progesterona micronizada.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas. Tratamiento del anestro post-parto y disminución de las pérdidas embrionarias.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
5 ml por animal.
Presentación:
Frascos con 50 y 100 ml de contenido neto.

Description:
Hormonal.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Micronized progesterone.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of the estrous cycle in heifers and cows. Treatment of post-parturition anestrus and reduction of embryonic losses.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
5 ml per animal.
Presentation:
Vials containing 50 or 100 ml.

Hormonales. Inyectables | Hormonals. Injectable

Oxitocina
FUERTE OVER



Descripción: Hormonal.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Oxitocina sintética.....2.000 U.I.
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de retención de secundinas, atonía uterina, debilidad primaria y secundaria de las contracciones uterinas durante el período expulsivo del parto, metritis, hemorragias post parto y agalactia post parto. Coadyuvante en el tratamiento de la mastitis. Causa la contracción de las células mioepiteliales de los acinos lácteos, provocando la eyección de la leche.
Especies a las que se destina: Yeguas, vacas, cerdas, ovejas, cabras, perras gatas y zorras.
Administración: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.
Dosificación: Yeguas y vacas: Vía intramuscular o subcutánea: 3-6 ml; vía endovenosa: 2-4 ml. **Cerdas de hasta 200 kg:** Vía intramuscular o subcutánea: 3 ml; vía endovenosa: 2 ml. **Cerdas de más de 200 kg:** Dosis proporcionales. **Ovejas, cabras, gatas, perras y zorras:** Vía intramuscular o subcutánea: 0,3-1,5 ml; vía endovenosa: 0,2-1 ml.
Presentación: Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description: Hormonal.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Synthetic oxytocin.....2,000 I.U.
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment of retained afterbirths, uterine atony, primary and secondary weaknesses of the uterine contractions during fetal expulsion, metritis, post-parturition hemorrhage and post-parturition agalactia. Coadjuvant in the treatment of mastitis. It causes the contraction of the acinar myoepithelial cells, which produces milk ejection.
Animal species to which it is intended: Mares, cows, sows, ewes, female goats, female cats, female dogs and female foxes.
Administration: By subcutaneous, intramuscular or intravenous route.
Dosage: Mares and cows: 3 to 6 ml intramuscularly or subcutaneously; 2 to 4 ml intravenously. **Sows weighing up to 200 kg:** 3 ml intramuscularly or subcutaneously; 2 ml intravenously. **Sows weighing more than 200 kg:** Proportional doses. **Ewes, goats, female cats, female dogs and female foxes:** 0.3 to 1.5 ml intramuscularly or subcutaneously; 0.2 to 1 ml intravenously.
Presentation: Vial containing 50 ml.

Oxitocina
OVER



Descripción: Hormonal.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Oxitocina sintética.....1.000 U.I.
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de retención de secundinas, atonía uterina, debilidad primaria y secundaria de las contracciones uterinas durante el período expulsivo del parto, metritis, hemorragias post parto y agalactia post parto. Coadyuvante en el tratamiento de la mastitis.
Especies a las que se destina: Yeguas, vacas, cerdas, ovejas, cabras, perras, gatas y zorras.
Administración: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.
Dosificación: Yeguas y vacas: Vía intramuscular o subcutánea: 3-6 ml; vía endovenosa: 2-4 ml. **Cerdas de hasta 200 kg:** Vía intramuscular o subcutánea: 3 ml; vía endovenosa: 2 ml. **Cerdas de más de 200 kg:** Dosis proporcionales. **Ovejas, cabras, gatas, perras y zorras:** Vía intramuscular o subcutánea: 0,3-1,5 ml; vía endovenosa: 0,2-1 ml.
Presentación: Frascos con 50, 100 y 250 ml de contenido neto. Caja con 12 frascos de 10 ml de contenido neto.

Description: Hormonal.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Synthetic oxytocin.....1,000 I.U.
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment for retained placenta, uterine atony, primary and secondary weaknesses caused by uterine contractions during fetal expulsion, metritis, post-parturition hemorrhage and post-parturition agalactia. Coadjuvant in the treatment of mastitis.
Animal species to which it is intended: Mares, cows, sows, ewes, female goats, female cats, female dogs and female foxes.
Administration: By subcutaneous, intramuscular or intravenous route.
Dosage: Mares and cows: 3 to 6 ml intramuscularly or subcutaneously; 2 to 4 ml intravenously. **Sows weighing up to 200 kg:** 3 ml intramuscularly or subcutaneously; 2 ml intravenously. **Sows weighing more than 200 kg:** proportional doses. **Ewes, goats, female cats, female dogs and female foxes:** 0.3 to 1.5 ml intramuscularly or subcutaneously; 0.2 to 1 ml intravenously.
Presentation: Vials containing 50, 100 or 250 ml. Box containing 12 vials with 10 ml each.

Prostal



Descripción:
Hormonal.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
D (+) Cloprostenol.....0,0075 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Sincronización del celo. Inducción al parto o al aborto. Tratamiento de desórdenes funcionales del ciclo estral, de los ovarios (quistes luteales o foliculares) y patologías uterinas post parto (piómetras, endometritis).
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos y porcinos.
Administración:
Vía intramuscular.
Dosificación:
Bovinos: 2 ml. **Equinos:** 1 ml. **Porcinos:** 1 ml.
Presentación:
Frascos con 20 y 50 ml de contenido neto. Caja con 24 frascos con 2 ml de contenido neto.

Description:
Hormonal.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
D (+) Cloprostenol.....0.0075 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Heat synchronization. Parturition or abortion induction. Treatment of functional disorders of the estrous cycle and the ovary (luteal or follicular cysts). Treatment of post-parturition uterine pathologies (pyometra, endometritis).
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses and swine.
Administration:
By intramuscular route.
Dosage:
Cattle: 2 ml. **Horses:** 1 ml. **Swine:** 1ml.
Presentation:
Vials containing 20 or 50 ml. Box containing 24 vials with 2 ml each.

Sincrover
700



Descripción:
Dispositivo intravaginal.
Fórmula:
Cada dispositivo contiene:
Progesterona.....700 mg activo
Polímero inerte.....c.s.
Indicaciones:
Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas. Sincronización de celo. Tratamiento del anestro post parto. Acortamiento del período concepción - parto.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración y dosificación:
Se aplica en forma intravaginal utilizando un aplicador diseñado para facilitar la colocación.
Presentación:
Bolsa conteniendo 10 dispositivos.

Description:
Intravaginal device.
Formula:
Each device contains:
Progesterone.....700 mg (active)
Inert polymer.....q.s.
Indications:
Control of the estrous cycle in heifers and cows. Heat synchronization. Treatment of the post-parturition anestrus. Reduction of the conception-parturition period.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration and dosage:
It is applied intravaginally with the aid of an applicator.
Presentation:
Bag containing 10 devices.

Hormonales. Dispositivos Intravaginales | Hormonals. Intravaginal Devices

Sincrover
1000



Descripción:
Dispositivo intravaginal.
Fórmula:
Cada dispositivo contiene:
Progesterona.....1000 mg activo
Polímero inerte.....c.s.
Indicaciones:
Control del ciclo estral en vacas y vaquillonas. Sincronización de celo. Tratamiento del anestro post parto. Acortamiento del período concepción - parto.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración y dosificación:
Se aplica en forma intravaginal utilizando un aplicador diseñado para facilitar la colocación.
Presentación:
Bolsa conteniendo 10 dispositivos.

Description:
Intravaginal device.
Formula:
Each device contains:
Progesterone.....1000 mg (active)
Inert polymer.....q.s.
Indications:
Control of the estrous cycle in heifers and cows. Heat synchronization. Treatment of the post-parturition anestrus. Reduction of the conception-parturition period.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration and dosage:
It is applied intravaginally with the aid of an applicator.
Presentation:
Bag containing 10 devices.

LÍNEA REPRODUCTIVA OVER

Fertilidad

Ceftiover Maxium.
Estradiol Multidosis.
Estrosinc. Forcecarb.
Gestar. Metrisan.
Overgest. Prostal.
Sincrover.



Reproductive medicines and hormonals OVER.
FERTILITY

www.over.com.ar

over®
MEDICINA VETERINARIA

OTROS
OTHER PRODUCTS

11

Antitóxico POLIVALENTE
Atropina 1% OVER
Coagulamax DUO
Dipirona 50% OVER
Hepatoprotector OVER
Ioduro de Sodio al 60% OVER
Lidocaína OVER 2%
Menbutiox
Xilazina 10% OVER
Xilazina OVER

Antitóxico
POLIVALENTE



Descripción:
Antídoto.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Nitrito de sodio.....6 g
Tiosulfato de sodio.....60 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Antídoto de intoxicaciones provocadas por el ácido cianhídrico y sus sales, producidas por la ingestión de glucósidos cianogenéticos.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos y caprinos.
Administración:
Vía endovenosa.
Dosificación:
Bovinos: Adultos: 25 ml; terneros: 10 ml. **Ovinos y caprinos:** Adultos: 10 ml; jóvenes: 2,5 ml.
Presentación:
Frasco con 25 ml de contenido neto.

Description:
Antidote.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Sodium nitrite.....6 g
Sodium thiosulfate.....60 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Antidote for intoxications caused by hydrocyanic acid and its salts as a consequence of ingesting cyanogenic glycosides.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep and goats.
Administration:
By intravenous route.
Dosage:
Cattle: 25 ml for adult animals; 10 ml for calves. **Sheep and goats:** 10 ml for adult animals; 2.5 ml for young animals.
Presentation:
Vial containing 25 ml.

Atropina
1% OVER



Descripción:
Agente parasimpaticolítico. Anticolinérgico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Atropina sulfato.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Para casos en que es necesario inhibir las secreciones salivales y gástricas (pre anestesia), y disminuir la motilidad gastrointestinal en cólicos y diarreas. Acción antiespasmódica a nivel de uréter y vejiga. Antídoto para intoxicaciones por fosforados.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
Bovinos y equinos: 5 a 10 ml. **Porcinos y ovinos:** 2 a 4 ml. **Caninos y felinos:** 0,1 a 0,5 ml.
Presentación:
Caja con 12 frascos de 10 ml de contenido neto cada uno. Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description:
Anticholinergic. Parasympatholytic agent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Atropine sulfate.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
For cases where it is necessary to inhibit salivary and gastric secretions (pre-anesthesia) and decrease gastrointestinal motility in colics and diarrhea. Antispasmodic action at the level of the ureter and the bladder. Antidote for intoxications caused by phosphorus compounds.
Animal species to which it is intended:
Horses, cattle, sheep, swine, dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
Horses and cattle: 5 to 10 ml. **Sheep and swine:** 2 to 4 ml. **Dogs and cats:** 0.1 to 0.5 ml.
Presentation:
Box containing 12 vials with 10 ml each. Vial containing 50 ml.

Coagulamax
DUO



Descripción:
Coagulante.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Etamsilato.....15 g
Vitamina K1.....0,05 g
Agentes de formulación.....c.s.p.
Indicaciones:
Prevención y control de hemorragias espontáneas y post quirúrgicas.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o endovenosa lenta.
Dosificación:
1 ml cada 25 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description:
Coagulant.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ethamsylate.....15 g
Vitamin K1.....0.05 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention and control of spontaneous and post-surgical hemorrhages.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine, sheep, dogs and cats.
Administration:
By intramuscular or slow intravenous route.
Dosage:
1 ml every 25 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 50 ml.

Dipirona
50% OVER



Descripción:
Analgésico. Antipirético. Antiinflamatorio. Antiespasmódico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Dipirona sódica.....50 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de estados febriles, estados dolorosos, espasmos, cólicos, inflamaciones (artritis, tendinitis, miositis, reumatismos, etc.).
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
Administración:
Vía intramuscular y endovenosa.
Dosificación:
Bovinos: Dosis orientativa: 20 a 50 mg por k.p.v.; adultos: 20 a 50 ml; terneros: 5 a 15 ml. **Equinos:** Dosis orientativa: 10 a 25 mg por k.p.v.; adultos: 10 a 20 ml; potrillos: 5 a 15 ml. **Ovinos:** Dosis orientativa: 50 mg por k.p.v.; adultos: 8 a 10 ml; jóvenes: 2 a 5 ml. **Porcinos:** Dosis orientativa: 50 a 100 mg por k.p.v.; adultos: 10 a 30 ml; jóvenes: 5 a 10 ml. **Caninos:** 0,25 ml cada 4,5 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Analgesic. Antipyretic. Anti-inflammatory. Antispasmodic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Sodium dipyrone.....50 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of febrile conditions, painful conditions, spasms, colics, inflammations (arthritis, tendinitis, myositis, rheumatism, etc.).
Animal species to which it is intended:
Horses, cattle, sheep, swine and dogs.
Administration:
By intramuscular or intravenous route.
Dosage:
Cattle: Suggested dose of 20 to 50 mg per k.l.w.; 20 to 50 ml for adult animals; 5 to 15 ml for calves. **Horses:** Suggested dose of 10 to 25 mg per k.l.w.; 10 to 20 ml for adult animals; 5 to 15 ml for colts. **Sheep:** Suggested dose of 50 mg per k.l.w.; 8 to 10 ml for adult animals; 2 to 5 ml for young animals. **Swine:** Suggested dose of 50 to 100 mg per k.l.w.; 10 to 30 ml for adult animals; 5 to 10 ml for young animals. **Dogs:** 0.25 ml every 4.5 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 100 and 250 ml.

Hepato-protector
OVER



Descripción:
Protector hepático.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ácido tióctico.....0,4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de insuficiencia hepática de diversas etiologías, hepatitis agudas y crónicas, cetosis y meteorismo. Especialmente indicado en intoxicaciones por químicos (tetracloruro de carbono), metales pesados (mercurio y plomo), medicamentos, alimentos, plantas tóxicas, venenos, con o sin compromiso hepático.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.
Dosificación:
Bovinos y equinos: 5 a 10 ml cada 100 k.p.v. **Caninos y felinos:** 1 ml cada 4 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 100 ml de contenido neto.

Description:
Hepatic protector.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Thioctic acid.....0.4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of liver failure produced by miscellaneous causes, acute and chronic hepatitis, ketosis and meteorism. It is specially indicated for intoxications produced by chemicals (carbon tetrachloride), heavy metals (mercury and lead), medicines, foods, toxic plants, poisons, with or without hepatic involvement.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous, intramuscular or intravenous route.
Dosage:
Cattle and horses: 5 to 10 ml every 100 k.l.w. **Dogs and cats:** 1 ml every 4 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 100 ml.

Ioduro de Sodio
al 60% OVER



Descripción:
Antiséptico. Quimioterápico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ioduro de sodio.....60 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de actinobacilosis y actinomicosis.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía endovenosa.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description:
Antiseptic. Chemotherapeutic agent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Sodium iodide.....60 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of actinobacillosis and actinomycosis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intravenous route.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 50 ml.

Lidocaína
OVER 2%



Descripción:
Anestésico local.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Lidocaína clorhidrato.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Anestesia de infiltración o bloqueo nervioso, anestesia epidural y de superficie.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía subcutánea, intramuscular o epidural.
Dosificación:
Anestesia de infiltración o bloqueo nervioso: 2 a 50 ml. **Anestesia epidural:** Grandes animales: posterior: 3 a 20 ml, anterior: 20 a 120 ml; Pequeños animales: 1 ml cada 2,5 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Local anesthetic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Lidocaine hydrochloride.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
For infiltration anesthesia or nervous block, epidural anesthesia and surface anesthesia.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, swine, dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous, intramuscular or epidural route.
Dosage:
Infiltration anesthesia or nervous block: 2 to 50 ml. **Epidural anesthesia:** For large animals, administer 3 to 20 ml on the hind limbs or 20 to 120 ml on the fore limbs; for small animals, administer 1 ml every 2.5 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100 and 250 ml.

Otros | Other Products

Menbutiox



Descripción:
Normalizador gástrico, duodenal y biliar.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Menbutona.....10 g
Ácido tióctico.....0,5 g
Lidocaína clorhidrato.....0,4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Casos en los que se requiere estimulación de las secreciones digestivas tales como: indigestiones, toxemias, cetosis, anorexia, insuficiencia hepática y pancreática.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.
Administración:
Vía intramuscular profunda o endovenosa lenta.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 100 ml de contenido neto.

Description:
Gastric, duodenal and biliary normalizer.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Menbutone.....10 g
Thioctic acid.....0.5 g
Lidocaine hydrochloride.....0.4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cases in which the stimulation of digestive secretions is required, namely: indigestion, toxemia, ketosis, anorexia, hepatic and pancreatic failure.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine, sheep, goats and dogs.
Administration:
By deep intramuscular or slow intravenous route.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 100 ml.

Xilazina
10% OVER



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Sedante. Anestésico. Relajante muscular. Analgésico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Xilazina clorhidrato.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Pre-anestesia y anestesia general en combinación con Ketamina. Como sedativo antes de procedimientos menores (con anestesia local) y para facilitar el manejo.
Especies a las que se destina:
Equinos deportivos.
Administración:
Vía intravenosa o intramuscular.
Dosificación:
Anestésico: Intravenosa: 1,1 ml cada 100 k.p.v.; intramuscular: 2,2 ml cada 100 k.p.v. **Sedante para cólicos:** Intravenosa: 0,2 a 0,5 ml cada 100 k.p.v.; intramuscular: 0,6 a 1 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 50 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Sedative. Anesthetic. Muscle relaxant. Analgesic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Xylazine hydrochloride.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Pre-anesthesia and general anesthesia in combination with ketamine. It is indicated as a sedative before minor procedures (with local anesthesia) and to facilitate handling the animal.
Animal species to which it is intended:
Sport horses.
Administration:
By intravenous or intramuscular route.
Dosage:
Anesthetic: 1.1 ml every 100 k.l.w. (intravenously); 2.2 ml every 100 k.l.w. (intramuscularly). **Sedative for colics:** 0.2 to 0.5 ml every 100 k.l.w. (intravenously); 0.6 to 1 ml every 100 k.l.w. (intramuscularly).
Presentation:
Vial containing 50 ml.

Xilazina
OVER



Descripción:
Sedante. Analgésico. Anestésico. Relajante muscular.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Xilazina clorhidrato.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Pre-anestesia y anestesia general en combinación con Ketamina. Como sedativo antes de procedimientos menores (con anestesia local) y para facilitar el manejo.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, caninos y felinos.
Administración:
Bovinos: Vía intramuscular. **Equinos:** Vía intramuscular o intravenosa lenta. **Caninos:** Vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. **Felinos:** Vía intramuscular.
Dosificación:
Bovinos: 0,25 a 1,5 ml cada 100 k.p.v. **Equinos:** Intramuscular: 1 a 1,5 ml cada 10 k.p.v.; intravenosa lenta: 3 a 5,5 ml cada 100 k.p.v. **Caninos:** 0,05 a 0,15 ml por k.p.v. **Felinos:** 0,15 ml por k.p.v.
Presentación:
Frasco con 10 ml de contenido neto.

Description:
Sedative. Analgesic. Anesthetic. Muscle relaxant.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Xylazine hydrochloride.....2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Pre-anesthesia and general anesthesia in combination with ketamine. It is indicated as a sedative before minor procedures (with local anesthesia) and to facilitate handling the animal.
Animal species to which it is intended:
Horses, cattle, dogs and cats.
Administration:
Cattle: By intramuscular route. **Horses:** By intramuscular or slow intravenous route. **Dogs:** By subcutaneous, intramuscular or intravenous route. **Cats:** By intramuscular route.
Dosage:
Cattle: 0.25 to 1.5 ml every 100 k.l.w. **Horses:** 1 to 1.5 ml every 10 k.l.w. (intramuscularly); 3 to 5.5 ml every 100 k.l.w. (intravenously in a slow way). **Dogs:** 0.05 to 0.15 ml every k.l.w. **Cats:** 0.15 ml every k.l.w.
Presentation:
Vial containing 10 ml each.

VITAMÍNICOS Y MINERALIZANTES
VITAMINICS AND MINERALIZERS

12

Inyectables / Injectable
Complejo B FUERTE OVER
Cuprexan A.P.
Hematover PLUS
Neocuprexan
Over ADE
Overcal 50% FUERTE
Overferr 200
Overfos PLUS
Overvital ULTRA
Revical
Revimag PLUS
Revimín
Revisel PLUS ADE

Orales / Oral
Booster HORSE OVER
Hidramax OVER
Vitamínico MINERAL OVER

Complejo B
FUERTE OVER



Descripción: Suplemento preventivo terapéutico vitamínico.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Vitamina B1.....10 g
Vitamina B2.....0,5 g
Vitamina B6.....5 g
Vitamina B12.....75 mcg
Nicotinamida.....5,5 g
Pantotenato de calcio.....1,75 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Bovinos: Coadyuvante en la recuperación de casos de anaplasmosis y/o piroplasmosis. **Equinos:** Para casos de debilidad, agotamiento por sobreentrenamiento, inapetencias, estados carenciales y refuerzo de dietas. **Porcinos, caninos y felinos:** Favorece la recuperación para el caso de anemias de distintos orígenes (carenciales, por hemorragias y/o parasitarias).
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración: Bovinos, equinos y porcinos adultos: Vía intramuscular. **Lechones, caninos y felinos:** Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación: Bovinos: 5 a 10 ml. **Equinos:** 5 ml. **Porcinos adultos**: 1 ml cada 20 k.p.v. **Lechones:** 1 ml. **Caninos y felinos:** 0,5 a 1 ml.
Presentación: Frascos con 20, 50 y 100 ml de contenido neto.

Description: Preventive and therapeutic vitaminic supplement.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Vitamin B1.....10 g
Vitamin B2.....0.5 g
Vitamin B6.....5 g
Vitamin B12.....75 mcg
Nicotinamide.....5.5 g
Calcium pantothenate.....1.75 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Cattle: Coadjuvant in the recovery of anaplasmosis and/or piroplasmosis cases. **Horses:** Weakness, exhaustion due to overtraining, loss of appetite, deficiency states and diet reinforcement. **Swine, dogs and cats:** It encourages the recovery in case of anemia produced by deficiencies, hemorrhages and/or parasitic diseases.
Animal species to which it is intended: Cattle, horses, swine, dogs and cats.
Administration: Adult cattle, horses and swine: By intramuscular route. **Piglets, dogs and cats:** By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage: Cattle: 5 to 10 ml. **Horses:** 5 ml. **Adult swine:** 1 ml every 20 k.l.w. **Piglets:** 1 ml. **Dogs and cats:** 0.5 to 1 ml.
Presentation: Vials containing 20, 50 or 100 ml.

Vitamínicos y Mineralizantes. Inyectables
Vitaminics and Mineralizers. Injectable

Cuprexan
A.P.



Descripción:
Complejo cúprico.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Etilendinitrilo tetraacetato de cobre y calcio.....18,26 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de hipocuprosis.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Vacas, toros, novillos y vaquillonas: 4 ml.
Terneros mayores de 6 meses: 3 ml.
Terneros menores de 6 meses: 2 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Cupric complex.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Copper and calcium ethylene dinitrilotetraacetate.....18.26 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of hypocuprosis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Cows, bulls, steers and heifers: 4 ml.
Calves older than 6 months of age: 3 ml.
Calves younger than 6 months of age: 2 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Hematover
PLUS



Descripción: Complejo hematínico. Reconstituyente.
Fórmula: Cada 100 ml contiene: Cacodilato de sodio 3 g; Citrato de hierro amoniacal 2 g; Glicerofosfato de sodio 1 g; Gluconato de cobre 0,25 g; Gluconato de manganeso 0,8 g; Acetato de cobalto 0,05 g; Triptófano 0,25 g; Histidina 0,5 g; Metionina 1 g; Vitamina B1 5 g; Vitamina B12 0,0011 g; Vitamina B2 0,2 g; Nicotinamida 5 g; Vitamina B6 1 g; Agentes de formulación c.s.
Indicaciones: Coadyuvante para la recuperación de animales que padecieron enfermedades infecciosas, parasitarias o metabólicas. Tratamiento de trastornos de la hematopoyesis, debilidad, agotamiento, convalecencia, y sobreentrenamiento en animales deportivos.
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.
Administración: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa lenta.
Dosificación: Bovinos y equinos adultos: 10 a 20 ml. **Terneros y potrillos:** 5 a 10 ml. **Ovinos y caprinos:** 5 ml. **Porcinos:** 1 ml cada 2 a 10 k.p.v.; 2 ml cada 11 a 20 k.p.v.; 5 ml cada 21 a 50 k.p.v.; 10 ml para más de 50 k.p.v. **Caninos y felinos:** 1 ml cada 5 k.p.v.
Presentación: Frascos con 10, 50, 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

Description: Hematinic complex. Restorative.
Formula: Every 100 ml, it contains: Sodium cacodylate 3 g; Ammonium iron citrate 2 g; Sodium glycerophosphate 1 g; Copper gluconate 0.25 g; Manganese gluconate 0.8 g; Cobalt acetate 0.05 g; Tryptophan 0.25 g; Histidine 0.5 g; Methionine 1 g; Vitamin B1 5 g; Vitamin B12 0.0011 g; Vitamin B2 0.2 g; Nicotinamide 5 g; Vitamin B6 1 g; Formulation agents q.s.
Indications: Coadjuvant in the recovery of animals having suffered infectious, parasitic or metabolic diseases. Treatment of disorders arising from hematopoiesis, weakness, exhaustion, convalescence, and overtraining in sport animals.
Animal species to which it is intended: Cattle, horses, swine, sheep, goats, dogs and cats.
Administration: By subcutaneous, intramuscular or slow intravenous route.
Dosage: Adult cattle and horses: 10 to 20 ml. **Calves and foals:** 5 to 10 ml. **Sheep and goats:** 5 ml. **Swine:** 1 ml every 2 to 10 k.l.w.; 2 ml every 11 to 20 k.l.w.; 5 ml every 21 to 50 k.l.w.; 10 ml for more than 50 k.l.w. **Dogs and cats:** 1 ml every 5 k.l.w.
Presentation: Vials containing 10, 50, 100, 250 or 500 ml.

Vitamínicos y Mineralizantes. Inyectables | Vitaminics and Mineralizers. Injectable

Neocuprexan



Descripción:
Suplemento mineral.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cobre metálico (como edetato).....1,5 g
Zinc metálico (como edetato).....5 g
Manganeso (como gluconato).....1 g
Selenio (como selenito de sodio).....0,5 g
Iodo (como ioduro de potasio).....0,038 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento preventivo de las deficiencias de cobre, zinc, selenio, iodo y manganeso.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Terneros hasta 200 kg: 1 ml cada 50 k.p.v. **Bovinos en recría y adultos:** 1 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Mineral supplement.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Metallic copper (as edetate).....1.5 g
Metallic zinc (as edetate).....5 g
Manganese (as gluconate).....1 g
Selenium (as sodium selenite).....0.5 g
Iodine (as potassium iodide).....0.038 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Preventive treatment of copper, zinc, selenium, iodine and manganese deficiencies.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Calves weighing up to 200 kg: 1 ml every 50 k.l.w. **Growing and adult cattle:** 1 ml every 100 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Over
ADE



Descripción:
Vitamínico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina A palmitato.....25.000.000 U.I.
Vitamina D3.....7.000.000 U.I.
Vitamina E.....7.000 U.I.
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención de carencias de vitaminas A, D y E.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos y ovinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Bovinos, equinos y ovinos: 1 ml cada 50 k.p.v. **Porcinos:** adultos: 3 ml; recría: 1 ml; lechones menores de 3 meses: 0,5 ml.
Presentación:
Frascos con 50, 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vitaminic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Vitamin A palmitate.....25,000,000 I.U.
Vitamin D3.....7,000,000 I.U.
Vitamin E.....7,000 I.U.
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It prevents the deficiencies of vitamins A, D and E.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine and sheep.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
Cattle, horses and sheep: 1 ml every 50 k.l.w. **Swine:** for adults, administer 3 ml; for growing animals, administer 1 ml; for piglets younger than 3 months of age, administer 0.5 ml.
Presentation:
Vials containing 50, 100 or 250 ml.

Vitamínicos y Mineralizantes. Inyectables
Vitaminics and Mineralizers. Injectable

Overcal
50% FUERTE



Descripción:
Calcificante.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Gluconato de calcio.....50 g
Hipofosfito de magnesio hexahidratado.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de hipocalcemia, hipomagnesemia, acetonemia, paresia puerperal, tetania, osteomalacia, eclampsia, fiebre vitular, raquitismo, fiebre del transporte, intoxicaciones y estados en que las necesidades de calcio aumentan (crecimiento, preñez, lactancia).
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
Administración:
Vía intravenosa, intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Dosis orientativa: Bovinos adultos y equinos: 100 ml. **Terneros y potrillos:** 50 ml. **Ovinos y porcinos:** 20 ml. **Caninos:** 5-10 ml.
Presentación:
Frasco con 100 ml de contenido neto.

Description:
Calcifying agent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Calcium gluconate.....50 g
Magnesium hypophosphite hexahydrate.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of hypocalcemia, hypomagnesemia, acetonemia, puerperal paresis, tetany, osteomalasia, eclampsia, calving fever, rickets, transport fever, intoxications and states requiring an increase of calcium (growth, pregnancy, lactation).
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine and dogs.
Administration:
By intravenous, intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
Suggested dose: Horses and adult cattle: 100 ml. **Calves and foals:** 50 ml. **Sheep and swine:** 20 ml. **Dogs:** 5 to 10 ml.
Presentation:
Vial containing 100 ml.

Overferr
200



Descripción:
Antianémico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Hierro dextrano.....20 g
Vitamina B12.....0,0005 g
Cloruro de cobalto.....0,001 g
Sulfato de zinc.....0,05 g
Cacodilato de sodio.....0,3 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención de anemia ferropénica.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Administración:
Vía intramuscular.
Dosificación:
Al 3° día de nacido: 1 ml por animal.
Entre 7 y 21 días de vida: 1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 100 ml de contenido neto.

Description:
Antianemic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Iron dextran .....20 g
Vitamin B12.....0.0005 g
Cobalt chloride.....0.001 g
Zinc sulfate .....0.05 g
Sodium cacodylate.....0.3 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention of iron deficiency anemia.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Administration:
By intramuscular route.
Dosage:
At the 3rd day from birth: 1 ml per animal.
Between 7 and 21 days of life: 1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 100 ml.

Vitamínicos y Mineralizantes. Inyectables | Vitaminics and Mineralizers. Injectable

Overfos
PLUS



Descripción: Mineralizante.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Gliserofosfato de sodio.....14 g
Fosfato monosódico.....20,1 g
Cloruro de cobre.....0,4 g
Cloruro de potasio.....0,6 g
Cloruro de magnesio.....2,5 g
Selenito de sodio.....0,22 g
Gluconato de manganeso.....0,8 g
Sulfato de zinc.....0,04 g
Citrato de sodio.....2 g
Ácido cítrico.....3 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de carencias minerales, desnutrición, anemias, falta de desarrollo, enflaquecimiento y raquitismo. También está indicado para períodos críticos como destete, crianza artificial, servicio y convalecencia de enfermedades.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
Bovinos adultos: 2,5 ml cada 100 k.p.v.
Terneros: 2,5 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frasco con 500 ml de contenido neto.

Description:
Mineralizer.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Sodium glycerophosphate.....14 g
Monosodium phosphate.....20.1 g
Copper chloride.....0.4 g
Potassium chloride.....0.6 g
Magnesium chloride.....2.5 g
Sodium selenite.....0.22 g
Manganese gluconate.....0.8 g
Zinc sulfate.....0.04 g
Sodium citrate.....2 g
Citric acid.....3 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of mineral deficiencies, undernutrition, anemia, lack of growth, emaciation and rickets. It is also indicated for critical periods such as weaning, artificial breeding, mating and post-illness convalescence.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration: By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
Adult cattle: 2.5 ml every 100 k.l.w.
Calves: 2.5 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vial containing 500 ml.

Overvital
ULTRA



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción: Modulador orgánico.
Fórmula: Cada 100 ml contiene: Metionina 0,21 g; Arginina 0,2 g; Histidina HCl 0,21 g; Leucina 0,21 g; Lisina HCl 1 g; Treonina 0,1 g; Triptofano 0,05 g; Valina 0,2 g; Fenilalanina 0,23 g; Isoleucina 0,2 g; Glicina 0,42 g; ATP 0,6 g; Sodio cloruro 0,042 g; Sodio glicerofosfato 0,1 g; Calcio gluconato 0,0038 g; Cobalto gluconato 0,02 g; Manganeso gluconato 0,32 g; Glutamato de sodio 0,42 g; Magnesio gluconato 0,41 g; Zinc gluconato 0,17 g; Sodio selenito 0,05 g; Potasio ioduro 0,2 g; Agentes de formulación c.s.
Indicaciones: Regulador del metabolismo, promotor del crecimiento, estimulante orgánico de las deficiencias causadas por la carencia de aminoácidos, vitaminas y oligoelementos. Suplemento auxiliar de las deficiencias nutricionales. Coadyuvante de tratamiento de deficiencias causadas por infecciones parasitarias.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos y caprinos.
Administración: Vía subcutánea.
Dosificación: Bovinos adultos: 10 ml por animal. **Terneros, caprinos y ovinos:** 5 ml por animal.
Presentación: Frascos con 50, 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description: Organic modulator.
Formula: Every 100 ml, it contains: Methionine 0.21 g; Arginine 0.2 g; Histidine HCl 0.21 g; Leucine 0.21 g; Lysine HCl 1 g; Threonine 0.1 g; Tryptophan 0.05 g; Valine 0.2 g; Phenylalanine 0.23 g; Isoleucine 0.2 g; Glycine 0.42 g; ATP 0.6 g; Sodium chloride 0.042 g; Sodium glycerophosphate 0.1 g; Calcium gluconate 0.0038 g; Cobalt gluconate 0.02 g; Manganese gluconate 0.32 g; Sodium glutamate 0.42 g; Magnesium gluconate 0.41 g; Zinc gluconate 0.17 g; Sodium Selenite 0.05 g; Potassium iodide 0.2 g; Formulation agents q.s.
Indications: Metabolism regulator, growth promoter, organic stimulant against deficiencies caused by the lack of amino acids, vitamins and trace elements. Auxiliary supplement to counteract nutritional deficiencies. Coadjuvant in the treatment of deficiencies caused by parasitic infections.
Animal species to which it is intended: Cattle, sheep and goats.
Administration: By subcutaneous route.
Dosage: Adult cattle: 10 ml per animal. **Calves, goats and sheep:** 5 ml per animal.
Presentation: Vials containing 50, 100, 250 or 500 ml.

Vitamínicos y Mineralizantes. Inyectables | Vitaminics and Mineralizers. Injectable

Revical



Descripción: Calcificante energético.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Gluconato de calcio.....20 g
Ácido bórico.....3 g
Cloruro de magnesio.....5 g
Glucosa anhidra.....10 g
Benzoato de sodio.....0,1 g
Cafeína.....0,1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipomagnesemia, acetonemia, paresia puerperal, tetania, osteomalacia, eclampsia, fiebre vitular, raquitismo, fiebre del transporte, intoxicaciones y estados en que las necesidades de calcio aumentan (crecimiento, preñez, lactancia).
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
Administración: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.
Dosificación: Dosis orientativa: Bovinos y equinos adultos: 200 a 750 ml. **Terneros, potrillos, ovinos y cerdos:** 50 a 125 ml. **Corderos y lechones:** 5 a 20 ml. **Caninos:** 5 a 20 ml.
Presentación: Frasco con 500 ml de contenido neto. Sachet con 500 ml de contenido neto con perfus y aguja.

Description:
Energetic calcifying agent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Calcium gluconate.....20 g
Boric acid.....3 g
Magnesium chloride.....5 g
Anhydrous glucose.....10 g
Sodium benzoate.....0.1 g
Caffeine.....0.1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment and prevention of hypocalcemia, hypomagnesemia, acetonemia, puerperal paresis, tetany, osteomalasia, eclampsia, calving fever, rickets, transport fever, intoxications and states requiring an increase of calcium (growth, pregnancy, lactation).
Animal species to which it is intended: Cattle, horses, sheep, swine and dogs.
Administration: By subcutaneous, intramuscular or intravenous route.
Dosage: Suggested dose: Adult cattle and horses: 200 to 750 ml. **Calves, foals, sheep and swine:** 50 to 125 ml. **Lambs and piglets:** 5 to 20 ml. **Dogs:** 5 to 20 ml.
Presentation: Vial containing 500 ml. Sachet containing 500 ml, provided with perfus and needle.

Revimag PLUS



Descripción: Mineralizante.
Fórmula: Cada 100 ml contiene: Gluconato de magnesio 15 g; Cloruro de magnesio hexahidratado 5 g; Sulfato de zinc 0,5 g; Hipofosfito de calcio 2,13 g; Hipofosfito de magnesio 3 g; Ácido bórico 3,5 g; Agentes de formulación c.s.
Indicaciones: Tratamiento y prevención de las deficiencias de magnesio. Preventivo en los rodeos o majadas con antecedentes previos de síndromes hipoenergéticos y/o hipomagnesemia. Se recomienda su aplicación ante situaciones fuertemente estresantes (transporte, destete, temporales, consumo de verdeos de invierno, esquila, inicio del último tercio de gestación en ovinos). Tratamiento de disfunciones metabólicas originadas por una brusca alteración de los requerimientos energéticos y/o magnesio en los rumiantes (tetania de la hierba, cetosis en las vacas lecheras, síndrome de la vaca gorda, toxemia de la preñez en ovejas, síndrome hipoenergético en ovinos).
Especies a las que se destina: Bovinos y ovinos.
Administración: Vía subcutánea o endovenosa.
Dosificación: Vacas de 500 k.p.v.: 20 ml por vía subcutánea; 300 a 500 ml por vía endovenosa lenta. **Novillitos:** 15 ml por vía subcutánea; 100 ml por vía endovenosa. **Terneros:** 5-10 ml por vía subcutánea; 50 ml por vía endovenosa. **Ovinos:** 5 ml por vía subcutánea; 20-50 ml por vía endovenosa.
Presentación: Frascos con 50, 250 y 500 ml de contenido neto.

Description: Mineralizer.
Formula: Every 100 ml, it contains: Magnesium gluconate 15 g; Magnesium chloride, hexahydrate 5 g; Zinc sulfate 0.5 g; Calcium hypophosphite 2.13 g; Magnesium hypophosphite 3 g; Boric acid 3.5 g; Formulation agents q.s.
Indications: Treatment and prevention of magnesium deficiencies. It is administered preventively in herds or flocks with a previous history of hypoenergetic syndromes and/or hypomagnesemia. Its application is recommended in situations of severe stress (transport, weaning, storms, consumption of winter pastures, shearing, start of the last third period of gestation in sheep). Treatment of metabolic dysfunctions caused by a sudden alteration of the energy and/or magnesium requirements in ruminants (grass tetany, ketosis in dairy cows, fat cow syndrome, pregnancy toxemia in sheep, hypoenergetic syndrome in sheep).
Animal species to which it is intended: Cattle and sheep.
Administration: By subcutaneous or intravenous route.
Dosage: Cattle weighing up to 500 k.l.w.: 20 ml subcutaneously; 300 to 500 ml intravenously in a slow way. **Steers:** 15 ml subcutaneously; 100 ml intravenously. **Calves:** 5 to 10 ml subcutaneously; 50 ml intravenously. **Sheep:** 5 ml subcutaneously; 20 to 50 ml intravenously.
Presentation: Vials containing 50, 250 or 500 ml.

Vitamínicos y Mineralizantes. Inyectables
Vitaminics and Mineralizers. Injectable

Revimín



Descripción: Vitamínico. Mineralizante.
Fórmula: Cada 100 ml contiene: Vitamina A palmitato 0,5 g; Vitamina B1 0,5 g; Vitamina B2 0,01 g; Vitamina B6 0,02 g; Vitamina B12 0,01 g; Ácido pantoténico 0,2 g; Vitamina D2 0,01 g; Vitamina E 0,25 g; Cloruro de calcio 0,2 g; Cloruro de magnesio 1 g; Cloruro de cobalto 0,05 g; Cloruro de manganeso 0,04 g; Cloruro de zinc 0,04 g; Cloruro de cobre 0,2 g; Cloruro de potasio 0,1 g; Cloruro de sodio 0,2 g; Ioduro de potasio 0,04 g; Glicerofosfato de sodio 0,1 g; Citrato de hierro amoniacal 0,1 g; Hipofosfito de calcio 1 g; Agentes de formulación c.s.
Indicaciones: Tratamiento y prevención de carencias vitamínico-minerales, desnutrición, anemia, falta de apetito, falta de desarrollo, enflaquecimiento, raquitismo. También está indicado para períodos críticos como destete, crianza artificial, servicio y convalecencia de enfermedades.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración: Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación: Terneros y porcinos: 5 ml. **Vacas y novillos:** 10 ml. **Toros:** 15 ml. **Ovinos:** 3 ml. **Caninos, felinos, lechones y corderos:** 1 ml.
Presentación: Frascos con 50, 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

Description: Vitaminic. Mineralizer.
Formula: Every 100 ml, it contains: Vitamin A palmitate 0.5 g; Vitamin B1 0.5 g; Vitamin B2 0.01 g; Vitamin B6 0.02 g; Vitamin B12 0.01 g; Pantothenic acid 0.2 g; Vitamin D2 0.01 g; Vitamin E 0.25 g; Calcium chloride 0.2 g; Magnesium chloride 1 g; Cobalt chloride 0.05 g; Manganese chloride 0.04 g; Zinc chloride 0.04 g; Copper chloride 0.2 g; Potassium chloride 0.1 g; Sodium chloride 0.2 g; Potassium iodide 0.04 g; Sodium glycerophosphate 0.1 g; Ammonium iron citrate 0.1 g; Calcium hypophosphite 1 g; Formulation agents q.s.
Indications: Treatment and prevention of vitamin and mineral deficiencies, undernutrition, anemia, lack of appetite, lack of growth, emaciation, rickets. It is also indicated for critical periods such as weaning, artificial breeding, mating and post-illness convalescence.
Species to which it is intended: Cattle, sheep, swine, dogs and cats.
Administration: By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage: Calves and swine: 5 ml. **Cows, steers:** 10 ml. **Bulls:** 15 ml. **Sheep:** 3 ml. **Dogs, cats, piglets and lambs:** 1 ml.
Presentation: Vials containing 50, 100, 250 or 500 ml.

Revisel
PLUS ADE



Descripción:
Vitamínico. Mineralizante.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina E acetato.....6800 U.I.
Selenito de sodio al 45%.....1,09 g
Vitamina A palmitato.....3.000.000 U.I.
Vitamina D3.....1.000.000 U.I.
Gluconato de calcio.....5 g
Glicerofosfato de sodio.....5 g
Hipofosfito de magnesio.....3 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de estados carenciales de Selenio, Fósforo, Magnesio y Vitaminas A, D y E.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Dosis orientativa: 2,5 ml cada 100 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 250 y 500 ml de contenido neto.

Description:
Vitaminic. Mineralizer.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Vitamin E acetate.....6,800 I.U.
Sodium selenite at 45%.....1.09 g
Vitamin A palmitate.....3,000,000 I.U.
Vitamin D3.....1,000,000 I.U.
Calcium gluconate.....5 g
Sodium glycerophosphate.....5 g
Magnesium hypophosphite.....3 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of selenium, phosphorus, magnesium and vitamins A, D, E deficiencies.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By intramuscular or subcutaneous route.
Dosage:
Suggested dose: 2.5 ml every 100 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 250 or 500 ml.

Booster Horse
OVER



Descripción:
Suplemento energético pre-competencia.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
ATP sódico.....2,45 g
Vitamina B15.....0,5 g
Taurina.....1,5 g
Sorbitol.....10 g
Maltodextrina.....10 g
Indicaciones:
Mejora de la eficiencia muscular, del incremento de la resistencia a la fatiga y de la reducción de la producción de ácido láctico.
Especies a las que se destina:
Equinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 jeringa 48 hs antes de la competencia, 1 jeringa 24 hs antes, y 1 jeringa 8 a 10 hs antes de la competencia.
Presentación:
Caja conteniendo 1 jeringa con 30 g de contenido neto.

Description:
Pre-competition energetic supplement.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Sodium ATP.....2.45 g
Vitamin B15.....0.5 g
Taurine.....1.5 g
Sorbitol.....10 g
Maltodextrin.....10 g
Indications:
It improves the muscular efficiency, the fatigue strength increase and the reduction of lactic acid production.
Animal species to which it is intended:
Horses.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 syringe 48 hours before the competition, 1 syringe 24 hours before the competition and 1 syringe 8 to 10 hours before the competition.
Presentation:
Box containing 1 (one) 30 g-syringe.

Hidramax
OVER



Descripción:
Complemento dietario.
Fórmula:
Cada 50 ml contiene:
Glucosa pura inyectable.....19,5 g
Acetato de sodio.....18,325 g
Cloruro de sodio.....3,2 g
Cloruro de potasio.....3,2 g
Glutamina.....0,215 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Mantener el balance electrolítico, balance ácido-base y niveles de energía.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
50 ml por animal sólo o diluido en 2 litros de agua, leche o sustituto lácteo.
Presentación:
Balde con 60 pomos de 50 ml de contenido neto cada uno.

Description:
Dietary supplement.
Formula:
Every 50 ml, it contains:
Injectable pure glucose.....19.5 g
Sodium acetate.....18.325 g
Sodium chloride.....3.2 g
Potassium chloride.....3.2 g
Glutamine.....0.215 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It maintains the electrolytic balance, the acid-base balance and the energy levels.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route.
Dosage:
50 ml per animal. It can be administered alone or diluted in 2 liters of water, milk or milk substitute.
Presentation:
Bucket containing 60 collapsible tubes with 50 ml each.

Vitamínicos y Mineralizantes. Orales
Vitaminics and Mineralizers. Oral

Vitamínico
MINERAL OVER



Descripción: Complejo vitamínico mineral.
Fórmula: Cada 100 g contiene:
Vitamina A 150.000 U.I.; Vitamina D3 200.000 U.I.; Vitamina B1 140 mg; Vitamina B2 160 mg; Vitamina B6 20 mg; Vitamina B12 25 mcg; Vitamina E 45 mg; Nicotinamida 350 mg; Pantotenato de calcio 90 mg; Mezcla de minerales traza 10 g; Agentes de formulación c.s.
Indicaciones: Complementa las dietas normales de los animales, aportando vitaminas y minerales para suplementar las carencias más comunes.
Especies a las que se destina: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración: Vía oral mezclado con la ración o el agua de bebida.
Dosificación: Equinos: Yeguas de cría en la segunda mitad de la preñez y durante la lactancia: 25 a 50 g por día. Potros y potros jóvenes recién destetados: 12 g por día. Potrancas, potrillos, padrillos y caballos en entrenamiento: 12 a 24 g por día. Ponies o caballos de pequeña alzada: 6 a 12 g por día. **Bovinos:** Terneros: 6 g cada 48 hs. Vaquillonas, vacas y toros: 6 a 12 g por día. **Ovinos:** Corderos, borregos y carneros: 6 g cada 48 hs. Ovejas en cría: 6 g por día. **Porcinos:** Cerdas de cría: 6 a 12 g por día. **Caninos y felinos:** 3 a 6 g cada 48 hs.
Presentación: Sobre con 1 kg de contenido neto. Caja conteniendo 10 sobres de 100 g de contenido neto. Balde con 10 kg de contenido neto.

Description: Mineral and vitamin complex.
Formula: Every 100 g, it contains:
Vitamin A 150,000 I.U.; Vitamin D3 200,000 I.U.; Vitamin B1 140 mg; Vitamin B2 160 mg; Vitamin B6 20 mg; Vitamin B 12 25 mcg; Vitamin E 45 mg; Nicotinamide 350 mg; Calcium pantothenate 90 mg; Mix of trace minerals 10 g; Formulation agents q.s.
Indications: It complements the animal's normal diet, providing vitamins and minerals to supplement the most common deficiencies.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine, dogs and cats.
Administration: By oral route, mixed with the food ration or the drinking water.
Dosage: Horses: for breeding mares during their second half of pregnancy and lactation, administer 25 to 50 g per day; for foals and recently weaned young foals, administer 12 g per day; for fillies, colts, stallions and horses under training, administer 12 to 24 g per day; for ponies or small horses, administer 6 to 12 g per day. **Cattle:** for calves, administer 6 g every 48 hours. Heifers, cows and bulls: 6 to 12 g per day. **Sheep:** for lambs, yearling lambs and rams, administer 6 g every 48 hours; for breeding sheep, administer 6 g per day. **Swine:** for breeding sows, administer 6 to 12 g per day. **Dogs and cats:** 3 to 6 g every 48 hours.
Presentation: Pouch containing 1 kg. Box containing 10 pouches with 100 g each. Bucket containing 10 kg.

EXPORTACIONES
A MÁS DE
50 PAÍSES
DEL MUNDO

GMP

FABRICADOS
BAJO NORMAS
INTERNACIONALES
DE CALIDAD



COMPLEJO HEMANÍTICO.
RECONSTITUYENTE. TÓNICO GENERAL

HEMATOVER PLUS



3 AMINOÁCIDOS
5 VITAMINAS
CACODILATO DE SODIO
5 MINERALES

Hematinic complex. Restorative product. General tonic.
3 Amino acids. 5 Vitamins. Sodium cacodylate. 5 Minerals.

over®

hematoverplus.com.ar
www.over.com.ar

PROMOTORES DE CRECIMIENTO
GROWTH PROMOTERS

13

Inyectables / Injectable
Boldekyl
Ganekyl
Overweight M
Overweight M FORTE
Overweight MAX
Revimín PLUS
Vitabolic PLUS
Zeranol OVER

Orales / Oral
Monensina 20% OVER
Ractopamina OVER
Ractover 2% OVER
Zilpaterol OVER

Implantes / Implants
Implantes de Zeranol OVER

over®



Boldekyl



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Reconstituyente. Engordador.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Boldenona undecilenato.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Favorece el apetito y desarrollo muscular, aumenta el vigor y el estado físico general. Tratamiento de convalecencias post quirúrgicas, por enfermedades crónicas, parasitismo severo, sobreentrenamiento y procesos debilitantes.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos y porcinos.
Administración:
Vía intramuscular profunda.
Dosificación:
1 ml cada 90 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Restorative. Fattening agent.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Boldenone undecylenate.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It promotes appetite and muscle development. It increases the vigor and general fitness. Treatment of post-surgical convalescence, chronic diseases, severe parasitism, overtraining and debilitating processes.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses and swine.
Administration:
By deep intramuscular route.
Dosage:
1 ml every 90 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 100, 250 or 500 ml.

Promotores de crecimiento. Inyectables
Growth Promoters. Injectable



Ganekyl



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Promotor del crecimiento. Reconstituyente.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fenilpropionato de nandrolona.....5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Estimula el crecimiento y el engorde. Tratamiento de anemias, debilidad, anorexia, crecimiento retrasado, enflaquecimiento por enfermedad o déficit nutricional.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o subcutánea.
Dosificación:
Dosis orientativa: 1 ml cada 100 k.p.v. **Bovinos y equinos adultos:** 3 a 5 ml cada 30-45 días. **Bovinos y equinos medianos:** 2 a 3 ml cada 30-45 días. **Bovinos y equinos jóvenes:** 1 a 2 ml cada 30-45 días. **Ovinos y porcinos adultos:** 1 a 2 ml cada 30-45 días.
Presentación:
Frascos con 10, 100 y 250 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Growth promoter. Restorative.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Nandrolone phenylpropionate.....5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Growth and fattening stimulation. Treatment of anemia, weakness, anorexia, delayed growth, emaciation due to a disease or a nutritional deficit.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, sheep, swine, dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
Suggested dose: 1 ml every 100 k.l.w. **Adult cattle and horses:** 3 to 5 ml every 30 to 45 days. **Medium-sized cattle and horses:** 2 to 3 ml every 30-45 days. **Young cattle and horses:** 1 to 2 ml every 30 to 45 days. **Adult sheep and swine:** 1 to 2 ml every 30 to 45 days.
Presentation:
Vials containing 10, 100 or 250 ml.

Overweight
M



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Promotor del crecimiento.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Progesterona.....4 g
Estradiol benzoato.....0,4 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Favorece el engorde de los animales.
Especies a las que se destina:
Bovinos machos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
5 ml por animal.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Growth promoter.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Progesterone.....4 g
Estradiol benzoate.....0.4 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It improves the animal's fattening.
Animal species to which it is intended:
Male cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
5 ml per animal.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Promotores de crecimiento. Inyectables
Growth Promoters. Injectable

Overweight
M FORTE



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Promotor del crecimiento.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Progesterona.....5 g
Estradiol benzoato.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Favorece el engorde de los animales.
Especies a las que se destina:
Bovinos machos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
5 ml por animal.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Growth promoter.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Progesterone.....5 g
Estradiol benzoate.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It improves the animal's fattening.
Animal species to which it is intended:
Male cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
5 ml per animal.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Overweight
MAX



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Endectocida. Promotor del crecimiento.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.....1 g
Progesterona.....5 g
Estradiol benzoato.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Favorece el engorde de los animales. Control de parasitosis internas y externas.
Especies a las que se destina:
Bovinos machos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Endectocide. Growth promoter.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Ivermectin.....1 g
Progesterone.....5 g
Estradiol benzoate.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It improves the animal's fattening. It is indicated for the control of internal and external parasitosis.
Animal species to which it is intended:
Male cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 200 or 500 ml.

Promotores de crecimiento. Inyectables | Growth Promoters. Injectable

Revimín
PLUS



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción: Vitamínico. Reconstituyente. Promotor del crecimiento.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Vitamina A palmitato 0,5 g; Vitamina B1 0,5 g; Vitamina B2 0,01 g; Vitamina B6 0,02 g; Vitamina B12 0,01 g; Ácido pantoténico 0,2 g; Vitamina D2 0,01 g; Vitamina E 0,25 g; Nandrolona fenilpropionato 0,1 g; Cloruro de calcio 0,2 g; Cloruro de magnesio 1 g; Cloruro de cobalto 0,05 g; Cloruro de manganeso 0,04 g; Cloruro de zinc 0,04 g; Cloruro de cobre 0,2 g; Cloruro de potasio 0,1 g; Cloruro de sodio 0,2 g; Ioduro de potasio 0,04 g; Glicerofosfato de sodio 0,1 g; Citrato de hierro amoniacal 0,1 g; Hipofosfito de calcio 1 g; Agentes de formulación c.s.
Indicaciones: Tratamiento y prevención de carencias vitamínico-minerales, desnutrición, anemia, falta de apetito, falta de desarrollo, enflaquecimiento, raquitismo. También está indicado para períodos críticos como destete, crianza artificial, servicio y convalecencia de enfermedades.
Especies a las que se destina: Bovinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
Administración: Vía subcutánea.
Dosificación: Terneros y porcinos: 5 ml. **Vacas y novillos:** 10 ml. **Toros:** 15 ml. **Ovinos:** 3 ml. **Caninos, felinos, lechones y corderos:** 1 ml.
Presentación: Frascos con 50, 250 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description: Vitaminic. Restorative. Growth promoter.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Vitamin A palmitate 0.5 g; Vitamin B1 0.5 g; Vitamin B2 0.01 g; Vitamin B6 0.02 g; Vitamin B12 0.01 g; Pantothenic acid 0.2 g; Vitamin D2 0.01 g; Vitamin E 0.25 g; Nandrolone phenylpropionate 0.1 g; Calcium chloride 0.2 g; Magnesium chloride 1 g; Cobalt chloride 0.05 g; Manganese chloride 0.04 g; Zinc chloride 0.04 g; Copper chloride 0.2 g; Potassium chloride 0.1 g; Sodium chloride 0.2 g; Potassium iodide 0.04 g; Sodium glycerophosphate 0.1 g; Ammonium iron citrate 0.10 g; Calcium hypophosphite 1 g; Formulation agents q.s.
Indications: Treatment and prevention of vitamin and mineral deficiencies, undernutrition, anemia, lack of appetite, lack of growth, emaciation, rickets. It is also indicated for critical periods such as weaning, artificial breeding, mating and post-illness convalescence.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep, swine, dogs and cats.
Administration: By subcutaneous route.
Dosage: Calves and swine: 5 ml. **Cows and steers:** 10 ml. **Bulls:** 15 ml. **Sheep:** 3 ml. **Dogs, cats, piglets and lambs:** 1 ml.
Presentation: Vials containing 50, 250 or 500 ml.

Vitabolic
PLUS



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción: Vitamínico. Promotor de crecimiento.
Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Estanozolol.....5 g
Cacodilato de sodio.....1,5 g
Vitamina B1.....1 g
Vitamina B6.....0,5 g
Vitamina B12.....0,0005 g
Vitamina B15.....0,15 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de animales débiles, crecimiento retrasado, falta de apetito, animales enflaquecidos como consecuencia de enfermedades o déficit nutricionales, anemias, trastornos de la hematopoyesis, agotamiento, convalecencia, sobreentrenamiento en animales deportivos.
Especies a las que se destina: Equinos, camélidos, caninos deportivos y gallos de combate.
Administración: Vía intramuscular.
Dosificación: Equinos y camélidos: 5 ml por animal. **Caninos:** 2 ml por animal. **Gallos:** 0,5 a 1 ml por animal.
Presentación: Caja con 5 frascos de 1 ml. Frasco con 10 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description: Vitaminic. Growth promoter.
Formula: Every 100 ml, it contains:
Stanozolol.....5 g
Sodium cacodylate.....1.5 g
Vitamin B1.....1 g
Vitamin B6.....0.5 g
Vitamin B12.....0.0005 g
Vitamin B15.....0.15 g
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment of weak animals, delayed growth, lack of appetite, animals suffering emaciation as a result of diseases or nutritional deficits, anemia, disorders caused by hematopoiesis, exhaustion, convalescence and overtraining in sport animals.
Animal species to which it is intended: Sport horses, camelids, dogs and fighting cocks.
Administration: By intramuscular route.
Dosage: Horses and camelids: 5 ml per animal. **Dogs:** 2 ml per animal. **Cocks:** 0.5 to 1 ml per animal.
Presentation: Box containing 5 vials with 1 ml each. Vial containing 10 ml

Promotores de crecimiento. Inyectables | Growth Promoters. Injectable

Zeranol
OVER



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Promotor de crecimiento y engorde.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Zeranol.....1 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Favorece el engorde de animales.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml cada 50 k.p.v.
Presentación:
Frascos con 50, 200 y 500 ml de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Growth and fattening promoter.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Zeranol.....1 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It improves the animal's fattening.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml every 50 k.l.w.
Presentation:
Vials containing 50, 200 or 500 ml.

Monensina
20% OVER



Descripción:
Mejorador de la eficiencia productiva.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Monensina sódica.....20 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Mejora la conversión alimenticia y el aumento de peso. Previene la cetosis y la acidosis por modificación de la flora ruminal. Ayuda a asegurar la condición corporal adecuada de la vaca lechera al momento del parto.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento.
Dosificación:
150 g por tonelada de alimento o 100 mg (0,5 g) como dosis total diaria.
Presentación:
Baldes con 10 y 25 kg de contenido neto.

Description:
Productive efficiency improver.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Monensin sodium.....20 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It improves the feed conversion and weight gain. It prevents ketosis and acidosis by modifying the ruminal flora. It helps to ensure the proper body condition of the dairy cow at the time of parturition.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route, mixed with the food.
Dosage:
150 g per food ton or 100 mg (0.5 g) as a total daily dose.
Presentation:
Buckets containing 10 or 25 kg.

Ractopamina
OVER



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Modificador metabólico.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Ractopamina clorhidrato.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Incrementa la ganancia de peso, mejora la eficiencia alimenticia y la obtención de reses magras.
Especies a las que se destina:
Bovinos y porcinos.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento.
Dosificación:
50 a 200 g por tonelada de alimento.
Presentación:
Bolsa con 1 kg de contenido neto. Balde con 5 kg de contenido neto.

.

FOR EXPORT

Description:
Metabolic modifier.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Ractopamine hydrochloride.....10 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It increases the weight gain and improves the feeding efficiency and the production of lean beef cattle.
Animal species to which it is intended:
Cattle and swine.
Administration:
By oral route, mixed with the food.
Dosage:
50 to 200 g per ton of food.
Presentation:
Bag containing 1 kg. Bucket containing 5 kg.

Ractover
2% OVER



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Modificador orgánico.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Ractopamina clorhidrato.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.p
Indicaciones:
Incrementa la ganancia de peso, mejorando la eficiencia alimenticia e incrementando carcasa magra en cerdos en terminación.
Administración:
Vía oral mezclado con el alimento completo.
Especies a las que se destina:
Porcinos.
Dosificación:
250 g a 1000 g por tonelada de ración para incrementar la ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimenticia. 500 g a 1000 g por tonelada de ración para mejorar la calidad magra de la carcasa.
Presentación:
Balde con 5 kg de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Metabolic modifier.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Ractopamine hydrochloride.....2 g
Formulation agents..... q.s.
Indications:
The product increases weight gain, improving feed efficiency and augmenting the lean carcass of swine undergoing fattening procedures.
Administration:
By oral route, mixed with the whole food.
Animal species to which it is intended:
Swine.
Dosage:
250 g to 1,000 g per ton of food ration to increase weight gain and improve feed efficiency. 500 g to 1,000 g per ton of food ration to improve the carcass lean quality.
Presentation:
Bucket containing 5 kg.

Zilpaterol
OVER



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Promotor del rendimiento no esteroide.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Clorhidrato de zilpaterol.....4,8 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Mejora la ganancia de peso, la conversión alimenticia y el grado de rendimiento de la canal, disminuyendo el depósito de grasa.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía oral mezclado con la ración.
Dosificación:
125 g por tonelada de alimento.
Presentación:
Bolsa con 1 kg de contenido neto. Baldes con 5, 10 y 25 kg de contenido neto.

FOR EXPORT

Description:
Non-steroid performance promoter.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Zilpaterol hydrochloride.....4.8 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
It improves the weight gain, the food conversion and the carcass yield level, by decreasing the fat deposit.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By oral route, mixed with the food ration.
Dosage:
125 g per food ton.
Presentation:
Bag containing 1 kg. Buckets containing 5, 10 or 25 kg.

Implantes de Zeranol
OVER



EXCLUSIVO EXPORTACIÓN

Descripción:
Promotor de crecimiento y engorde.
Fórmula:
Cada pellet contiene 12 mg de Zeranol.
Indicaciones:
Favorece el engorde, incrementa el promedio de peso ganado y la eficiencia de la alimentación.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
3 pellets por animal.
Presentación:
Pellets envasados en carretel circular con 24 columnas de 3 unidades cada una. Frasco conteniendo 300 pellets.

FOR EXPORT

Description:
Growth and fattening promoter.
Formula:
Each pellet contains 12 mg of zeranol.
Indications:
It promotes fattening and increases the average weight gained and the feeding efficiency.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
3 pellets per animal.
Presentation:
Pellets packed in a circular reel containing 24 columns with 3 units each. Vial containing 300 pellets.

BIOLÓGICOS
VACCINES

14

Overvac Anticarbunclosa
Overvac Anticlostridial TOTAL + P
Overvac Antidiarreica
Overvac Clostridial TOTAL
Overvac IBR Querato
Overvac Maxium TEC
Overvac Neumoentérica
Overvac Pregnatus
Overvac Triple

Overvac Antidiarreica



Descripción:
Vacuna contra la diarrea neonatal de los terneros.
Fórmula:
Vacuna inactivada conteniendo: Rotavirus Bovino, virus DVB y cepas nacionales de *Escherichia coli F5* (K99), *Salmonella dublin* y *Salmonella typhimurium.* Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Vacunación de vacas y vaquillonas preñadas, para proteger a los terneros contra la diarrea neonatal a través del calostro, y a terneros cuyas madres no fueron vacunadas.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
5 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine against the neonatal diarrhea of calves.
Formula:
Inactivated vaccine containing: Bovine rotavirus, BVD virus and national strains of *Escherichia coli F5 (*K99), *Salmonella dublin* and *Salmonella typhimurium.* Aluminium hydroxide gel is used as an adjuvant.
Indications:
Vaccination of pregnant cows and heifers to protect calves against neonatal diarrhea through colostrum and to protect calves whose mothers were not vaccinated.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
5 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac Clostridial TOTAL



Descripción:
Vacuna anticlostridial.
Fórmula:
Cultivos completos (bacterina + toxoide) de: *Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi* A y B, *Clostridium perfringens* tipos A, C y D, *Clostridium haemolyticum* (*novyi D*), *Clostridium sordellii* y Toxoide tetánico. Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Vacuna contra mancha, gangrena gaseosa, cabeza hinchada (big head), hepatitis necrosante, enterotoxemia, tétanos, hemoglobinuria y muerte súbita.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Bovinos: 5 ml. **Ovinos:** 2 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Anticlostridial vaccine.
Formula:
Complete cultures (bacterin + toxoid) of: *Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium novyi A* and B, *Clostridium perfringens A, C and D, Clostridium haemolyticum* (*novyi D*), *Clostridium sordellii* and tetanus toxoid. Aluminium hydroxide gel is used as an adjuvant.
Indications:
Vaccine against symptomatic carbuncle, gas gangrene, big head, necrotizing hepatitis, enterotoxemia, tetanus, hemoglobinuria and sudden death.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Cattle: 5 ml. **Sheep:** 2 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac Anticarbunclosa



Descripción:
Vacuna para la prevención del carbunclo bacteridiano.
Fórmula:
Esporos vivos de *bacillus anthracis* cepa *Sterne* (cepa viva atenuada).
Indicaciones:
Inmunización contra carbunclo bacteriano.
Especies a las que se destina:
Bovinos, equinos, porcinos y ovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Bovinos y equinos: 2 ml. **Porcinos y ovinos:** 1 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine for the prevention of bacterial carbuncle.
Formula:
Live spores of the Sterne-strain (live attenuated strain) of *Bacillus anthracis*.
Indications:
Immunization against bacterial carbuncle.
Animal species to which it is intended:
Cattle, horses, swine and sheep.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Cattle and horses: 2 ml. **Swine and sheep:** 1 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac Anticlostridial
TOTAL + P



Descripción:
Vacuna anticlostridial y antipasteurelosis.
Fórmula:
Anacultivos y toxoides de *Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium perfringens* tipos A, C y D, *Clostridium sordellii, Clostridium novyi* tipos A, B y D, *Clostridium tetani, Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica*. Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Prevención de mancha, gangrena, enterotoxemia, hemoglobinuria, tétanos y neumonías.
Especies a las que se destina:
Bovinos y ovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Bovinos: 5 ml. **Ovinos:** 2 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Anticlostridial and antipasteurellosis vaccine.
Formula:
Anacultures and toxoids of *Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium perfringens A, C and D, Clostridium sordellii, Clostridium novyi A, B* and *D, Clostridium tetani, Pasteurella multocida* and *Mannheimia haemolytica.* Aluminium hydroxide gel is used as an adjuvant.
Indications:
Prevention of symptomatic carbuncle, gangrene, enterotoxemia, hemoglobinuria, tetanus and pneumonias.
Animal species to which it is intended:
Cattle and sheep.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Cattle: 5 ml. **Sheep:** 2 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac IBR Querato



Descripción:
Vacuna contra queratoconjuntivitis de los bovinos.
Fórmula:
Vacuna inactivada conteniendo cepas autóctonas de *Moraxella Bovis* y Virus de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR).
Indicaciones:
Prevención de queratoconjuntivitis.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
5 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine against keratoconjunctivitis in cattle.
Formula:
Inactivated vaccine containing native strains of *Moraxella bovis* and Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (IBRV).
Indications:
Prevention of keratoconjunctivitis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
5 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Biológicos | Vaccines

Overvac Maxium
TEC



Descripción:
Vacuna para la prevención de infecciones respiratorias bovinas y querato-conjuntivitis, para uso en engorde a corral, tambo y cría.
Fórmula:
Vacuna inactivada conteniendo cepas nacionales de: *Pasteurella multocida* - Grupo A, *Mannheimia haemolytica, Salmonella dublin, Haemophilus somnus, Moraxella bovis* y Herpesvirus Bovino 1 (IBR), Virus Parainfluenza 3 (PI3V), Virus de Diarrea Viral Bovina (BVDV) y Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV). Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Prevención de enfermedades causadas por los virus IBR, DVB, PI3 y BRS. Neumonías por Pasteurella, Queratoconjuntivitis, Mancha y muerte súbita por Enterotoxemia Hemolítica.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
5 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine for the prevention of bovine respiratory infections and keratoconjunctivitis. It is indicated to be used in feedlots and milking farms and for breeding purposes.
Formula:
Inactivated vaccine containing national strains of: *Pasteurella multocida* - group A, *Mannheimia haemolytica, Salmonella dublin, Haemophilus somnus, Moraxella bovis* and Bovine herpesvirus 1 (IBR), parainfluenza 3 virus (PI3V), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) and Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV). Aluminium hydroxide gel is used as an adjuvant.
Indications:
Prevention of diseases caused by IBR, DVB, PI3 and BRS viruses. Pneumonias caused by Pasteurella, keratoconjunctivitis, symptomatic carbuncle and sudden death caused by hemolytic enterotoxemia.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
5 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac Neumoentérica



Descripción:
Vacuna contra neumonías y enteritis bacterianas y virales de los bovinos.
Fórmula:
Vacuna inactivada conteniendo cepas nacionales: *Pasteurella multocida* – Grupo A; *Pasteurella haemolytica; Salmonella dublin; Haemophilus somnus,* Herpesvirus Bovino 1 IBR; Virus Parainfluenza 3 (PI3V) y Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV). Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Prevención de neumonías y enteritis en bovinos.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
5 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine against bacterial and viral pneumonia and enteritis of cattle.
Formula:
Inactivated vaccine containing national strains of: *Pasteurella multocida* - Group A, *Pasteurella haemolytica, Salmonella dublin, Haemophilus somnus*, Bovine herpesvirus 1 (IBR); parainfluenza virus 3 (PI3V) and Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV). Aluminium hydroxide gel is used as an adjuvant.
Indications:
Prevention of pneumonias and enteritis in cattle.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
5 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac Pregnatus



Descripción:
Vacuna para la prevención de enfermedades reproductivas de los bovinos.
Fórmula:
Suspensión inactivada de: Virus de Rinotraqueitis Bovina Infecciosa (IBR), HBVI, Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV 1 citopático), *Leptospira interrogans serovar pomona, serovar canicola* y *serovar hardjo*, *Campylobacter fetus venerealis* y *fetus fetus* e *histophilus somni.* Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Prevención de enfermedades reproductivas producidas por: Rinotraqueitis Viral Bovina, Diarrea Viral Bovina, Leptospirosis, Campylobacteriosis y Hemofilosis.
Especies a las que se destina:
Bovinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
5 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine for the prevention of reproductive diseases affecting the cattle.
Formula:
Inactivated suspension of: Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (IBRV), BHV 1, Bovine Viral Diarrhea Virus (cytopathic BVDV 1), *Leptospira interrogans serovar pomona/canicola/hardjo*, *Campylobacter fetus venerealis/fetus fetus* and *histophilus somni.* Aluminium hydroxide gel is used as an adjuvant.
Indications:
Prevention of reproductive diseases caused by: bovine viral rhinotracheitis, bovine viral diarrhea, leptospirosis, campylobacteriosis and hemophilosis.
Animal species to which it is intended:
Cattle.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
5 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

Overvac Triple



Descripción:
Vacuna contra mancha, gangrena gaseosa y enterotoxemia.
Fórmula:
Bacterinas y toxoides de *Clostridium chauvoei, septicum* y *welchii* C y D. Gel de Hidróxido de Aluminio (adyuvante).
Indicaciones:
Inmunización contra infecciones clostridiales.
Especies a las que se destina:
Bovinos, ovinos y caprinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
Bovinos: 5 ml. **Ovinos y caprinos:** 3 ml.
Presentación:
Frascos con 100 y 250 ml de contenido neto.

Description:
Vaccine against symptomatic carbuncle, gas gangrene and enterotoxemia.
Formula:
Bacterins and toxoids of *Clostridium chauvoei/septicum/welchii* C and D. Aluminium hydroxide gel, is used as an adyuvant.
Indications:
Immunization against clostridial infections.
Animal species to which it is intended:
Cattle, sheep and goats.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
Cattle: 5 ml. **Sheep and goats:** 3 ml.
Presentation:
Vials containing 100 or 250 ml.

LÍNEA PEQUEÑOS ANIMALES
PRODUCT LINE FOR PETS

15

ANESTÉSICOS, ANALÉPTICOS Y TRANQUILIZANTES
ANAESTHETICS, ANALEPTICS AND TRANQUILIZERS
Inyectables / Injectable
Ketamina OVER
Orales / Oral
Sedante OVER

ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS
ANTIBIOTICS AND ANTIMYCOTICS
Cefalexina P.A. OVER
Ceftiover P.A.
Gotas Óticas OVER
Griseofulvina OVER 250

ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIALÉRGICOS
ANTI-INFLAMMATORIES AND ANTIALLERGICS
Inyectables / Injectable
Overxicam P.A.
Orales / Oral
Ketoprofeno OVER
Overxicam SUSPENSIÓN ORAL
Prednisolona OVER
Triamcinolona OVER

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS
EXTERNAL ANTIPARASITICS
Spot On / Spot On
Overdog MAX SPOT ON
Overline PET
Overline PET PLUS CANINOS
Overline PET PLUS FELINOS
Synect PET SPOT ON
Spray / Spray
Overdog PLUS SPRAY
Polvos / Powder
Synect PET TALCO

ANTIPARASITARIOS INTERNOS
INTERNAL ANTIPARASITICS
Overcox P.A.
Overmix PASTA
Overmix TOTAL
Oversole P.A.
Vermectín P.A.

GASTROENTEROLÓGICOS
GASTROENTEROLOGICAL PRODUCTS
Loperamida OVER
Neosulf
Overclop GOTAS

HORMONALES
HORMONALS
Inyectables / Injectable
Medroxiprogesterona OVER
Orales / Oral
Megestrol OVER

OTROS
OTHER PRODUCTS
Protector de Cartílago OVER
Shampoo OVER CON ALOE VERA

Ketamina
OVER



Descripción:
Anestésico, disociativo.
Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Ketamina base (como clorhidrato).50 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía intramuscular o endovenosa.
Dosificación:
Vía endovenosa: 7 a 10 mg por k.p.v. **Vía intramuscular:** 15 a 25 mg por k.p.v.
Presentación:
Frasco con 50 ml de contenido neto.

Description:
Anaesthetic, dissociative agent.
Formula:
Every 1 ml, it contains:
Ketamine base (as hydrochloride)..50 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Premedication, induction and maintenance of anesthesia.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By intramuscular or intravenous route.
Dosage:
Intravenously: 7 to 10 mg every k.l.w.
Intramuscularly: 15 to 25 mg every k.l.w.
Presentation:
Vial containing 50 ml.

Sedante
OVER



Descripción:
Tranquilizante.
Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Acepromacina maleato.....10 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Pre-anestesia. Facilita el manejo del animal en maniobras clínico-quirúrgicas, diagnósticas y en todos aquellos casos en que se requiera poner al animal indiferente a estímulos excitantes de su entorno.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral directa o disuelto en agua o leche.
Dosificación:
1 a 3 gotas por k.p.v.
Presentación:
Frasco gotero con 10 ml de contenido neto.

Description:
Tranquilizer.
Formula:
Every 1 ml, it contains:
Acepromazine maleate.....10 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Pre-anesthesia. It facilitates handling the animal in clinical-surgical and diagnostic maneuvers as well as in all those cases where it is necessary to put it indifferent to exciting stimuli from the surroundings.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By direct oral route, or dissolved in water or milk.
Dosage:
1 to 3 drops every k.l.w.
Presentation:
Dropper vial containing 10 ml.

Cefalexina
P.A. OVER



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Cefalexina monohidrato.....500 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de infecciones de piel, tejidos blandos, osteoarticulares, otitis (con tímpano perforado), vías respiratorias y genitourinarias.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 comprimido cada 20 k.p.v. como dosis promedio.
Presentación:
Caja conteniendo 5 blisters con 10 comprimidos cada uno. Caja conteniendo 20 blisters con 10 comprimidos cada uno.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Each tablet contains:
Cefalexin monohydrate.....500 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of skin, soft tissue, osteoarticular, otitis (with perforated eardrum), respiratory and genito-urinary tract infections.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 tablet every 20 k.l.w. as average dose.
Presentation:
Box containing 5 blisters with 10 tablets each. Box containing 20 blisters with 10 tablets each.

Ceftiover
P.A.



Descripción:
Antibiótico.
Fórmula:
Cada frasco con polvo contiene:
Ceftiofur base*.....0,2 g
(*) como sal sódica.
Cada frasco con solvente contiene:
Solvente estéril.....10 ml
Indicaciones:
Tratamiento y control de infecciones genitourinarias, respiratorias, piodermias, peritonitis y enfermedades infecciosas cuyo agente etiológico sea susceptible al ceftiofur.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml de solución preparada cada 10 k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo 2 frascos con ceftiofur y 2 frascos con solvente.

Description:
Antibiotic.
Formula:
Each vial with powder contains:
Ceftiofur sodium salt.....0.2 g
Each vial with solvent contains:
Sterile solvent.....10 ml
Indications:
Treatment and control of genito-urinary and respiratory infections, pyoderma, peritonitis, and infections caused by ceftiofur-susceptible germs.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml of prepared solution every 10 k.l.w.
Presentation:
Box containing 2 vials with ceftiofur and 2 vials with solvent.

Gotas Óticas
OVER



Descripción:
Antiparasitario. Antibiótico. Antimicótico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Cloranfenicol.....500 mg
Betametasona (como valerato).....100 mg
Clotrimazol.....1000 mg
Amitraz.....10 mg
Benzocaína.....1000 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de lesiones cutáneas o auriculares de origen micótico, parasitario o bacteriano.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Perros pequeños y gatos: 2 gotas en cada canal auricular. **Perros medianos:** 4 a 6 gotas. **Perros grandes:** 6 a 8 gotas.
Presentación:
Frasco gotero con 50 ml de contenido neto.

Description:
Antiparasitic. Antibiotic. Antimycotic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Chloramphenicol.....500 mg
Betamethasone (as valerate).....100 mg
Clotrimazole.....1,000 mg
Amitraz.....10 mg
Benzocaine.....1,000 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of cutaneous or auricular lesions of mycotic, parasitic or bacterial origin.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
External use.
Dosage:
Small dogs and cats: 2 drops. **Medium-sized dogs:** 4 to 6 drops. **Large dogs:** 6 to 8 drops.
Presentation:
Dropper vial containing 50 ml.

Griseofulvina
OVER



Descripción:
Fungistático.
Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Griseofulvina.....250 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de infecciones causadas por hongos dermatofíticos, de la piel, pelo y uñas.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
½ a 1 comprimido cada 10 k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo 5 blisters con 10 comprimidos cada uno.

Description:
Fungistat.
Formula:
Each tablet contains:
Griseofulvin.....250 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of infections caused by dermatophytic fungi. Skin, hair and nails infections.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
½ to 1 tablet every 10 k.l.w.
Presentation:
Box containing 5 blisters with 10 tablets each.

Overxicam
P.A.



Descripción:
Antiinflamatorio no esteroide.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Meloxicam.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Caninos: Alivio de la inflamación y el dolor en los trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos, post cirugías ortopédicas y de tejidos blandos. **Felinos:** Reducción del dolor post operatorio, post ovariohisterectomía o cirugías menores de tejidos blandos.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Caninos: Vía subcutánea o endovenosa.
Felinos: Vía subcutánea.
Dosificación:
Caninos: 0,4 ml cada 10 k.p.v. **Felinos:** 0,06 ml por k.p.v.
Presentación:
Frascos con 10 y 20 ml de contenido neto.

Description:
Non steroid anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Meloxicam.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Dogs: Relief of inflammation and pain in acute and chronic musculoskeletal disorders, as well as in post-orthopedic and soft tissue surgeries. **Cats:** Reduction of pain after surgeries, ovariohysterectomies and minor surgeries of soft tissues.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
Dogs: By subcutaneous or intravenous route.
Cats: By subcutaneous route.
Dosage:
Dogs: 0.4 ml every 10 k.l.w.
Cats: 0.06 ml per k.l.w.
Presentation:
Vials containing 10 or 20 ml.

Ketoprofeno
OVER



Descripción: Antiinflamatorio no esteroide.
Fórmula: Ketoprofeno OVER 5 mg
Cada comprimido de 175 mg contiene:
Ketoprofeno.....5 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Ketoprofeno OVER 20 mg
Cada comprimido de 700 mg contiene:
Ketoprofeno.....20 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones: Tratamiento de estados inflamatorios y dolorosos del sistema osteoarticular y musculoesquelético, tales como artrosis, artritis, traumatismos, hernias de disco y miositis.
Especies a las que se destina: Caninos y felinos.
Administración: Vía oral.
Dosificación: Animales de talla pequeña: Iniciar con 1 comprimido de 5 mg cada 2,5 k.p.v., continuando con 1 comprimido cada 5 k.p.v. **Animales de talla mediana y grande:** Iniciar con 1 comprimido de 20 mg cada 10 k.p.v., continuando con 1 comprimido cada 20 k.p.v.
Presentación: Caja conteniendo 5 blisters con 10 comprimidos cada uno. Caja conteniendo 20 blisters con 10 comprimidos cada uno.

Description:
Non steroid anti-inflammatory.
Formula:
Ketoprofeno OVER 5 mg
Each 175 mg-tablet contains:
Ketoprofen.....5 mg
Formulation agents .....q.s.
Ketoprofeno OVER 20 mg
Each 700 mg-tablet contains:
Ketoprofen.....20 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications: Treatment of inflammatory and painful conditions of the osteoarticular and musculoskeletal system, such as arthrosis, arthritis, traumatisms, herniated disc and myositis.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration: By oral route.
Dosage: Small-sized animals: Begin by administering 1 tablet of 5 mg every 2.5 k.l.w.; then, administer 1 tablet every 5 k.l.w. **Medium and large-sized animals:** Begin by administering 1 tablet of 20 mg every 10 k.l.w.; then, administer 1 tablet every 20 k.l.w.
Presentation: Box containing 5 blisters with 10 tablets each. Box containing 20 blisters with 10 tablets each.

Overxicam
SUSPENSIÓN ORAL



Descripción:
Antiinflamatorio no esteroide.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Meloxicam.....0,15 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Alivio de la inflamación y el dolor por trastornos musculoesqueléticos agudos y crónicos.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
2 gotas por k.p.v.
Presentación:
Frasco gotero con 10 ml de contenido neto.

Description:
Non steroid anti-inflammatory.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Meloxicam.....0.15 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Relief of inflammation and pain in acute and chronic musculoskeletal disorders.
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
By oral route.
Dosage:
2 drops per k.l.w.
Presentation:
Dropper vial containing 10 ml.

Antiinflamatorios y Antialérgicos. Orales
Anti-inflammatories and Antiallergics. Oral

Prednisolona
OVER



Descripción:
Glucocorticoide.
Fórmula:
Cada comprimido de 600 mg contiene:
Prednisolona base.....20 mg
Agentes de formulación .....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de procesos inflamatorios y alérgicos (prurito) en donde esté indicado el uso de glucocorticoides, y enfermedades autoinmunes. Coadyuvante en la terapéutica antineoplásica. Terapia de sustitución.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
Procesos inflamatorios y alérgicos: 0,5 a 1 mg por k.p.v. **Enfermedades autoinmunes y como coadyuvante de la terapéutica antineoplásica:** 2,4 mg por k.p.v. **Terapia de sustitución:** 0,25 mg por k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo 1 blister con 10 comprimidos. Caja conteniendo 20 blisters con 10 comprimidos cada uno.

Description:
Glucocorticoid.
Formula:
Every 600 mg-tablet contains:
Prednisolone base.....20 mg
Formulation agents .....q.s.
Indications:
Treatment of inflammatory or allergic (itch) processes where the use of glucocorticoids has been indicated. Autoimmune diseases. It is used as a coadjuvant to the antineoplastic therapy. Replacement therapy.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
Inflammatory and allergic processes: 0.5 to 1 mg per k.l.w. **Autoimmune diseases and as coadjuvant to antineoplastic therapies:** 2.4 mg per k.l.w. **Replacement therapy:** 0.25 mg per k.l.w.
Presentation:
Box containing 1 blister with 10 tablets. Box containing 20 blisters with 10 tablets each.

Triamcinolona
OVER



Descripción:
Glucocorticoide depot.
Fórmula:
Cada 1 ml contiene:
Acetonida de triamcinolona.....6 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento de la inflamación y de desórdenes alérgicos y dermatológicos.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía subcutánea o intramuscular.
Dosificación:
0,04 ml por k.p.v.
Presentación:
Frasco con 20 ml de contenido neto.

Description:
Depot glucocorticoid.
Formula:
Every 1 ml, it contains:
Triamcinolone acetonide.....6 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment of inflammation and allergic and dermatological disorders.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous or intramuscular route.
Dosage:
0.04 ml per k.l.w.
Presentation:
Vial containing 20 ml.

Overdog
MAX SPOT ON



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Permetrina.....50 g
Imidacloprid.....10 g
Piriproxifeno.....2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas. Repelente de insectos (mosquitos, flebótomos).
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Spot on.
Dosificación:
Caninos de 2 meses hasta 4 k.p.v.: 1 pipeta de 0,4 ml. **4 a 10 k.p.v.:** 1 pipeta de 1 ml. **10 a 25 k.p.v.:** 1 pipeta de 2,5 ml. **25 a 40 k.p.v.:** 1 pipeta de 4 ml. **40 a 60 k.p.v.:** 1 pipeta de 5,5 ml.
Presentación:
Pipetas con 0,4; 1; 2,5; 4 y 5,5 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Permethrin.....50 g
Imidacloprid.....10 g
Pyriproxyfen.....2 g
Formulation agents.....c.s.
Indications:
Treatment and prevention of infestations caused by fleas and ticks. Insect repellent (mosquitoes, sandflies).
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
Spot on.
Dosage:
Dogs from 2 months weighing up to 4 k.l.w.: 1 pipette of 0.4 ml. **Dogs weighing from 4 to 10 k.l.w.:** 1 pipette of 1 ml. **Dogs weighing from 10 to 25 k.l.w.:** 1 pipette of 2.5 ml. **Dogs weighing from 25 to 40 k.l.w.:** 1 pipette of 4 ml. **Dogs weighing from 40 to 60 k.l.w.:** 1 pipette of 5.5 ml.
Presentation:
Pipettes containing 0.4, 1, 2.5, 4 or 5.5 ml.

Overline
PET



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil.....10 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Caninos: Tratamiento y control de infestaciones por pulgas y garrapatas de los caninos. Tratamiento complementario de la DAPP. **Felinos:** Tratamiento y control de infestaciones por pulgas de los gatos. Tratamiento complementario de la DAPP.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Spot on.
Dosificación:
Caninos: 1 pipeta cada 45 días. En casos de altas cargas parasitarias se recomienda repetir el tratamiento cada 30 días. En casos de DAPP aplicar cada 30 días. **Felinos:** 1 pipeta por animal. En casos de DAPP aplicar cada 30 días.
Presentación:
Pipetas con 0,50 ml; 0,67 ml; 1,34 ml; 2,68 ml y 4,02 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Fipronil ..... 10 g
Formulation agents..... q.s.
Indications:
Dogs: Treatment and control of infestations caused by fleas and ticks in dogs. It is indicated to complement the treatment of the Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.). **Cats:** Treatment and control of infestations caused by fleas in cats. It is indicated to complement the treatment of the Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.)
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
Spot on.
Dosage:
Dogs: 1 pipette every 45 days. In cases of high parasitic loads, it is recommended to repeat the treatment every 30 days. In cases of Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.), apply the product every 30 days. **Cats:** 1 pipette for animal. In cases of F.A.D. apply the product every 30 days.
Presentation:
Pipettes containing 0.50, 0.67, 1.34, 2.68 or 4.02 ml.

Antiparasitarios Externos. Spot On | External Antiparasitics. Spot On

Overline
PET PLUS CANINOS



Descripción:
Antiparasitario externo.
Formula:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil.....10 g
Metoprene.....9 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de las infestaciones por pulgas y garrapatas de los caninos. Tratamiento complementario de la DAPP.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Spot on.
Dosificación:
1 pipeta cada 45 días. En caso de altas cargas parasitarias se recomienda repetir el tratamiento cada 30 días.
En casos de DAPP dosificar cada 30 días.
Presentación:
Pipetas con 0,67 ml; 1,34 ml; 2,68 ml y 4,02 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml it contains:
Fipronil ..... 10 g
Metropene..... ..... 9 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of infestations caused by fleas and ticks in dogs. It is indicated to complement the treatment of the Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.).
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
Spot on.
Dosage:
1 pippette every 45 days. In cases of high parasitic loads, it is recommended to repeat the treatment every 30 days. In cases of Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.), apply the product every 30 days.
Presentation:
Pipettes containing 0.67, 1.34, 2.68 and 4.02 ml.

Overline
PET PLUS FELINOS



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil.....10 g
Metoprene.....12 g
Agentes de formulación.....c.s.p.
Indicaciones:
Tratamiento y control de las infestaciones por pulgas en felinos.
Tratamiento complementario de la DAPP.
Especies animales a las que se destina:
Felinos.
Administración:
Spot on.
Dosificación:
Una pipeta por animal. El período de eficacia del producto es de 5 a 6 semanas aproximadamente, dependiendo de la carga parasitaria.
En casos de DAPP aplicar cada 30 días.
Presentación:
Pipeta con 0,50 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Each 100 ml contains:
Fipronil..... 10 g
Metropene.....12 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of infestations caused by fleas in cats. It is indicated to complement the treatment of the Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.).
Animal species to which it is intended:
Cats
Administration:
Spot on.
Dosage:
1 pippette per animal. The product efficacy period is around 5 to 6-week long, depending on the animal's parasitic load. In cases of Flea Allergy Dermatitis (F.A.D.), apply the product every 30 days.
Presentation:
Pipette containing 0.50 ml.

Synect
PET SPOT ON



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Imidacloprid.....6 g
Permetrina.....24 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Spot on.
Dosificación:
Hasta 4 k.p.v.: 1 pipeta de 0,4 ml. **Hasta 10 k.p.v.:** 1 pipeta de 1 ml. **Hasta 25 k.p.v.:** 1 pipeta de 2,5 ml. **Más de 25 k.p.v.:** 1 pipeta de 4 ml.
Presentación:
Pipetas con 0,4; 1; 2,5 y 4 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Imidacloprid.....6 g
Permethrin.....24 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention and treatment of infestations caused by fleas and ticks.
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
Spot on.
Dosage:
1 pipette of 0.4 ml for dogs of up to 4 k.l.w.; 1 pipette of 1 ml for dogs of up to 10 k.l.w.; 1 pipette of 2.5 ml for dogs of up to 25 k.l.w.; 1 pipette of 4 ml for dogs of more than 25 k.l.w.
Presentation:
Pipettes containing 0.4, 1, 2.5 or 4 ml.

Overdog
PLUS SPRAY



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Permetrina.....0,5 g
Piriproxifeno.....0,125 g
Butoxido de piperonilo.....2 g
Imidacloprid.....0,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas.
Tratamiento complementario de la DAPP.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Pulverizaciones.
Dosificación:
3 a 6 pulverizaciones por k.p.v.
Presentación:
Frascos con 100, 250 y 500 ml de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Permethrin.....0.5 g
Pyriproxyfen.....0.125 g
Piperonyl butoxide.....2 g
Imidacloprid.....0.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and prevention of infestations caused by fleas and ticks.
Complementary treatment for the flea allergy dermatitis.
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
By spraying.
Dosage:
3 to 6 sprays per k.l.w.
Presentation:
Vials containing 100, 250 or 500 ml.

Synect
PET TALCO



Descripción:
Antiparasitario externo.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Carbaril .....6 g
Tetrametrina.....0,125 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de pulgas.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Espolvorear sobre el animal procurando que no tome contacto con la piel del cuerpo, manos y patas. Se aconseja espolvorear la casilla o cucha.
Presentación:
Talquera con 100 g de contenido neto.

Description:
External antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Carbaryl.....6 g
Tetrametrine.....0.125 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of fleas.
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
Sprinkle the powder on the animal avoiding the contact with the skin of the body, hands and legs. It is recommended to sprinkle the product on the dog's box or basket.
Presentation:
Powder container with 100 g of powder.

Overcox
P.A.



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada comprimido de 750 mg contiene:
Toltrazuril.....200 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de coccidiosis.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
¼ comprimido cada 2,5 k.p.v. ½ comprimido cada 5 k.p.v. 1 comprimido cada 10 k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo un blíster con tres comprimidos.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Each 750 mg-tablet contains:
Toltrazuril.....200 mg
Formulation agents.....c.s.
Indications:
Treatment and control of coccidiosis.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
¼ tablet every 2.5 k.l.w.; ½ tablet every 5 k.l.w.; 1 tablet every 10 k.l.w.
Presentation:
Box containing 1 blister with 3 tablets.

Overmix
PASTA



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 g contiene:
Praziquantel.....2,5 g
Febantel.....7,5 g
Pamoato de pirantel.....7,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Control de nematodos y cestodos.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 jeringa por animal, segun rango de peso.
Presentación:
Cajas individuales con jeringas de 1, 2, 3, 5 y 10 g de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 g, it contains:
Praziquantel.....2.5 g
Febantel.....7.5 g
Pyrantel pamoate.....7.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Control of nematodes and cestodes.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 syringe per animal, according to its weight range.
Presentation:
Individual boxes containing 1 g-syringes, 2 g-syringes, 3 g-syringes, 5 g-syringes or 10 g-syringes.

Overmix
TOTAL



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada comprimido de 1600 mg contiene:
Ivermectina.....60 mcg
Praziquantel.....50 mg
Embonato de pirantel.....143 mg
Embonato de oxantel.....543 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de nematodos y cestodos. Prevención del gusano del corazón. Microfilaricida.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 comprimido cada 10 k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo un blister con 2 o 4 comprimidos palatables. Caja conteniendo 20 blisters con 2 comprimidos cada uno.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Each 1600 mg-tablet contains:
Ivermectin.....60 mcg
Praziquantel.....50 mg
Pyrantel embonate.....143 mg
Oxantel embonate.....543 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of nematodes and cestodes. Prevention of the heartworm disease. Microfilaricide.
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 tablet every 10 k.l.w.
Presentation:
Box containing a blister with 2 or 4 palatable tablets. Box containing 20 blisters with 2 tablets each.

Oversole
P.A



Descripción:
Antiparasitario interno.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Levamisol clorhidrato.....1,9 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*.
Especies a las que se destina:
Caninos.
Administración:
Vía oral, puro o diluido en agua.
Dosificación:
10 gotas por k.p.v. por día.
Presentación:
Frasco gotero con 15 ml de contenido neto.

Description:
Internal antiparasitic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Levamisole hydrochloride.....1.9 g
Formulation agents .....q.s.
Indications:
Treatment and control of *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* and *Toxascaris leonina*.
Animal species to which it is intended:
Dogs.
Administration:
By oral route, pure or diluted in water.
Dosage:
10 drops per k.l.w. per day.
Presentation:
Dropper vial containing 15 ml.

Vermectín
P.A.



Descripción:
Antiparasitario ecto-endo.
Fórmula:
Cada comprimido de 580 mg contiene:
Ivermectina.....5 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis externas (demodicosis felina, sarna notoédrica, sarna otodéctica y Cheyletielosis) y parasitosis internas causados por nematodos.
Especies a las que se destina:
Felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
300 mcg por k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo 6 blisters con 10 comprimidos cada uno. Caja conteniendo 20 blisters con 10 comprimidos cada uno.

Description:
Endoparasiticide and ectoparasiticide.
Formula:
Each 580 mg-tablet contains:
Ivermectin.....5 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of external parasitosis (demodicosis, notoedric mange, otodectic mange and cheyletiellosis) as well as internal parasitosis caused by nematodes.
Animal species to which it is intended:
Cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
300 mcg per k.l.w.
Presentation:
Box containing 6 blisters with 10 tablets each. Box containing 20 blisters with 10 tablets each.

Loperamida
OVER



Descripción:
Antidiarreico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Loperamida clorhidrato.....0,2 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento sintomático de diarrea aguda y crónica.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 gota por k.p.v.
Presentación:
Frasco gotero con 10 ml de contenido neto.

Description:
Antidiarrheal.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Loperamide hydrochloride.....0.2 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Symptomatic treatment of acute and chronic diarrhea.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 drop per k.l.w.
Presentation:
Dropper vial containing 10 ml.

Neosulf
PET



Descripción:
Antidiarreico.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ftalilsulfatiazol.....2,5 g
Estreptomicina sulfato.....0,5 g
Emulsión de Dimetilpolisiloxano al 10%.....1 g
Caolín coloidal.....1,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de diarreas polimicrobianas, colibacilosis, enteritis, gastroenteritis, diarreas fermentativas, y enteritis por intoxicación alimenticia. Coadyuvante en el tratamiento de enteritis parasitarias y víricas.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 ml por k.p.v.
Presentación:
Frasco con 100 ml de contenido neto.

Description:
Antidiarrheal.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Phthalylsulfathiazole.....2.5 g
Streptomycin sulfate.....0.5 g
Dimethylpolysiloxane at 10%.....1 g
Colloidal kaolin.....1.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of polymicrobial diarrhea, colibacillosis, enteritis, gastroenteritis, fermentative diarrhea and enteritis caused by food intoxication. Coadjuvant in the treatment of parasitic and viral enteritis.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 ml per k.l.w.
Presentation:
Vial containing 100 ml.

Overclop
GOTAS



Descripción:
Antiemético. Gastrocinético.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Metoclopramida clorhidrato.....0,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Tratamiento y control de vómitos de diversas etiologías, náuseas, vaciado gástrico y esofagitis por reflujo. Preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 ml cada 10 k.p.v.
Presentación:
Frasco gotero con 20 ml de contenido neto.

Description:
Antiemetic. Gastrokinetic.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Metoclopramide hydrochloride.....0.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Treatment and control of vomits produced by miscellaneous causes, nauseas, gastric emptying, reflux esophagitis. Preparation for radiological studies of the digestive tract.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 ml every 10 k.l.w.
Presentation:
Dropper vial containing 20 ml.

Medroxi-progesterona

OVER



Descripción:
Hormonal. Progestágeno. Contraceptivo.
Fórmula:
Cada 1 ml de suspensión acuosa contiene:
Medroxiprogesterona acetato.....50 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención del estro en caninos y felinos hembras en anestro.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía subcutánea.
Dosificación:
1 ml por animal.
Presentación:
Caja con 5 frascos de 1 ml de contenido neto cada uno.

Description:
Hormonal. Progestagen. Contraceptive.
Formula:
Each 1 ml of aqueous suspension contains:
Medroxyprogesterone acetate.....50 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention of estrus in female dogs and female cats during anestrus.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By subcutaneous route.
Dosage:
1 ml per animal.
Presentation:
Box containing 5 vials with 1 ml each.

Megestrol

OVER



Descripción:
Hormonal. Progestágeno. Contraceptivo.
Fórmula:
Cada comprimido de 200 mg contiene:
Megestrol acetato.....20 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención y supresión del celo.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 comprimido cada 10 k.p.v. por día, durante 8 días.
Presentación:
Caja conteniendo 1 blister con 8 comprimidos.

Description:
Hormonal. Progestagen. Contraceptive.
Formula:
Each 200 mg-tablet contains:
Megestrol acetate.....20 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Prevention and suppression of heat.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 tablet every 10 k.l.w. per day, during 8 days.
Presentation:
Box containing 1 blister with 8 tablets.

Protector de Cartílago
OVER



Descripción:
Suplemento dietario.
Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Glucosamina sulfato.....380 mg
Condroitín sulfato sódico.....170 mg
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Prevención y curación de afecciones articulares en las que está comprometido el cartílago articular.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Vía oral.
Dosificación:
1 comprimido cada 10 k.p.v.
Presentación:
Caja conteniendo 5 blisters con 10 comprimidos cada uno.

Description:
Dietary supplement.
Formula:
Every tablet contains:
Glucosamine sulfate.....380 mg
Chondroitin sulfate sodium.....170 mg
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Preventive and curative product for the treatment of articular diseases affecting the articular cartilage.
Animal species to which it is intended:
Dogs and cats.
Administration:
By oral route.
Dosage:
1 tablet every 10 k.l.w.
Presentation:
Box containing 5 blisters with 10 tablets each.

Shampoo OVER
CON ALOE VERA



Descripción:
Shampoo.
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Lauril etoxi sulfato de sodio al 25%....12 g
Betaína de coco.....10 g
Extracto glicólico de aloe vera.....1,5 g
Agentes de formulación.....c.s.
Indicaciones:
Higienización e hidratación de la piel normal y seca.
Especies a las que se destina:
Caninos y felinos.
Administración:
Uso externo.
Dosificación:
Se utilizará la cantidad necesaria de acuerdo al tamaño del animal, la cantidad y el largo del pelo.
Presentación:
Frasco con 250 ml de contenido neto.

Description:
Shampoo.
Formula:
Every 100 ml, it contains:
Sodium lauryl ethoxy sulfate at 25%.....12 g
Coconut betaine.....10 g
Glycolic extract of Aloe vera.....1.5 g
Formulation agents.....q.s.
Indications:
Cleaning up and hydration of normal and dry skin.
Animal species to which it is destined:
Dogs and cats.
Administration:
External use.
Dosage:
The product quantity depends on the animal size and its fur quantity and length.
Presentation:
Vial containing 250 ml.