

72 hs  
de acción



# OVERXICAM

ANTIINFLAMATORIO. ANTIPIRÉTICO. ANALGÉSICO.  
ANTIENDOTÓXICO


**over**®



# OVERXICAM

## PRINCIPIO ACTIVO

El **meloxicam** es un antiinflamatorio no esteroide (AINE) perteneciente al grupo oxicam, derivado de los ácidos enólicos. El meloxicam ha demostrado propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antipiréticas y antiendotóxicas.



Es un potente inhibidor de la síntesis de las prostaglandinas cuya acción deriva de la inhibición selectiva de la enzima ciclooxigenasa (COX 2).



**ANTIINFLAMATORIO:** Overxicam controla en forma rápida y prolongada el proceso inflamatorio



**ANALGÉSICO:** Overxicam bloquea la síntesis de mediadores químicos del dolor eliminándolo rápidamente.




**ANTIPIRÉTICO:** Overxicam combate el proceso febril en forma duradera.



**ANTIENDOTÓXICO:** Overxicam neutraliza la acción de las endotoxinas a nivel local y sistémico.

## MECANISMO DE ACCIÓN DEL OVERXICAM INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE LAS PROTAGLANDINAS



## VENTAJAS

- ✓ Mayor selectividad frente a ciclooxigenasa 2 (COX 2)
- ✓ Actúa en el foco del dolor e inflamación
- ✓ Amplio margen de seguridad. Sin efectos colaterales

## INDICACIONES DE USO


### BOVINOS:

- > Coadyuvante en el tratamiento de mastitis e infecciones respiratorias agudas, junto con la terapia antibiótica adecuada.
- > Antiinflamatorio y analgésico en afecciones del sistema locomotor.
- > Coadyuvante en el tratamiento de la diarrea en terneros.



### EQUINOS:

- > Tratamiento de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.
- > Alivio del dolor asociado al cólico.




### PORCINOS:

- > Coadyuvante en el tratamiento del síndrome metritis-mastitis-agalactia (MMA), junto con la terapia antibiótica apropiada.
- > Tratamiento de trastornos inflamatorios del aparato locomotor.
- > Como terapia de soporte en el tratamiento de infecciones respiratorias en combinación con el antibiótico adecuado.



## SEMIVIDA DE LOS DISTINTOS AGENTES ANTIINFLAMATORIOS



## MAYOR DURACIÓN



**1 sola aplicación de overxicam**

**72 hs de acción**



**DESCRIPCIÓN:**

Antiinflamatorio no esteroide (AINE).

**FÓRMULA:**

Cada 100 ml contiene:

Meloxicam..... 2 g

Excipientes .....c.s

**ESPECIES A LAS QUE SE LO DESTINA:**

Bovinos, porcinos, equinos.

**ADMINISTRACIÓN:**

Bovinos: Inyectable subcutánea o endovenosa.

Porcinos: Inyectable intramuscular.

Equinos: Inyectable endovenosa.

**DOSIFICACIÓN:**

Se aplica una dosis única. En cerdos, en caso de ser necesario, se puede administrar una segunda dosis con 24 hs. de intervalo.

Bovinos: 0,5 mg / k.p.v. (Equivalente a 2,5 ml de OVERXICAM cada 100 k.p.v.).

Porcinos: 0,4 mg / k.p.v. (Equivalente a 2 ml de OVERXICAM cada 100 k.p.v.).

Equinos: 0,6 mg/k.p.v. (Equivalente a 3 ml de OVERXICAM cada 100 k.p.v.).

**PRESENTACIÓN:**

Frascos con 10 y 50 ml de contenido neto.

# OVERXICAM

ANTIINFLAMATORIO. ANTIPIRÉTICO. ANALGÉSICO.  
ANTIENDOTÓXICO



OVER. Organización Veterinaria Regional S.R.L.  
 Laboratorio de Especialidades Veterinarias.  
 Alfonsina Storni 680. San Vicente. (S2447). Santa Fe. Argentina.  
 Tel. Fax: 0342-470696. labover@over.com.ar  
[www.over.com.ar](http://www.over.com.ar)