



Florxicam B


Florfenicol
Meloxicam
Bromhexina

Triple acción = 1 solución

over[®]
MEDICINA VETERINARIA

NUEVO

Solución
Inyectable





Florxicam B

Solución Inyectable

Florxicam B es una asociación antibiótica, expectorante y antiinflamatoria indicada para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos y porcinos causadas por bacterias sensibles al florfenicol. La bromhexina le confiere efecto expectorante broncopulmonar y el meloxicam contribuye a disminuir la inflamación propia de este tipo de patologías.

Florfenicol

+

Meloxicam

+

Bromhexina

**ANTIBIÓTICO
BACTERIOSTÁTICO
PERTENECIENTE
AL GRUPO DE LOS
FENICOLES QUE
ACTÚA INHIBIENDO
LA SÍNTESIS DE
PROTEÍNAS A NIVEL DE
LA SUBUNIDAD 50 S.**

**ANTIINFLAMATORIO
NO ESTEROIDEO (AINE)
CON SELECTIVIDAD POR
LA CICLOOXIGENASA-2
(COX-2) CON UNA
POTENTE ACCIÓN
ANTIINFLAMATORIA,
ANALGÉSICA
Y ANTIPIRÉTICA.**


**MUCOLÍTICO Y
EXPECTORANTE
QUE FAVORECE LA
ELIMINACIÓN DE
SECRECIONES
RESPIRATORIAS,
MEJORANDO
LA VENTILACIÓN
PULMONAR.**



Ventajas

Triple acción = 1 solución

- ✓ Combate el agente causal
- ✓ Reduce la inflamación, el dolor y la fiebre
- ✓ Facilita la eliminación de secreciones



EXCELENTE
JERINGABILIDAD



FRASCO
MULTIDOSIS



MAXIMIZA
LA RESPUESTA
TERAPÉUTICA



CONTRIBUYE
AL BIENESTAR
ANIMAL



SIMPLIFICA
EL MANEJO
DEL GANADO



Escaneá el QR
para acceder a más
información en
nuestra web.



**NORMAS
INTERNACIONALES
DE CALIDAD**

Florxicam B

Solución Inyectable

Triple acción = 1 solución

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:

Florfenicol	30,00 g
Bromhexina clorhidrato.....	0,75 g
Meloxicam	1,00 g
Agentes de formulación.....	c.s.p.

ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA:

Bovinos y porcinos.

INDICACIONES:

Asociación antibiótica, antiinflamatoria y expectorante/mucolítica indicada para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos y porcinos causadas por bacterias sensibles al florfenicol.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: *Vía intramuscular profunda (en el cuello):* 1 ml/15 k.p.v., repetir a las 48 hs. Equivale a 20 mg/k.p.v. de florfenicol, 0,5 mg/k.p.v. de bromhexina y 0,6 mg/k.p.v. de meloxicam. *Vía subcutánea (en el cuello):* ÚNICA DOSIS: 2 ml/15 k.p.v. equivale a 40 mg/k.p.v. de florfenicol, 1 mg/k.p.v. de bromhexina y 1,2 mg/k.p.v. de meloxicam.

Porcinos: *Vía intramuscular profunda (en el cuello):* 1 ml/20 k.p.v., repetir a las 48 hs. Equivale a 15 mg/k.p.v. de florfenicol, 0,4 mg/k.p.v. de bromhexina y 0,5 mg/k.p.v. de meloxicam.

PERÍODO DE RETIRO:

Bovinos: 28 días posteriores al último tratamiento. No usar en vacas en lactancia.

Porcinos: 18 días posteriores al último tratamiento.

PERÍODO DE VALIDEZ DESPUÉS DE ABIERTO EL ENVASE:
28 días.

PRESENTACIÓN: Frascos con 100 ml de contenido neto.